

PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

Patentex oval N, 75 mg vaginaalsuposiit Nonoksinool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Patentex oval N'i täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Patentex oval N ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Patentex oval N'i kasutamist
3. Kuidas Patentex oval N'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Patentex oval N'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON PATENTEX OVAL N JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Patentex oval N on tupekaudne rasestumisvastane vahend.

Toimeaine nonoksinool hävitab spermatoosidid koheselt. Rasestumisvastast toimet iseloomustav Pearl indeks on uuringute põhjal 0,3...1,6. Pearl indeks näitab soovimatute raseduste arvu 100 naise kohta, kes kasutavad antud meetodit ühe aasta.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PATENTEX OVAL N'i KASUTAMIST

Ärge kasutage Patentex oval N'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) nonoksinooli või Patentex oval N'i mõne koostisosa suhtes;
- kui teil on tupe verejooks;
- kui teil on tupepõletik;
- kui teil on emakakaelapõletik.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Patentex oval N

Arvestada tuleks ebaõige paigaldamise tagajärjel tekkida võiva rasestumisega.

Sugulisel teel levivate haiguste ära hoidmiseks tuleks Patentex oval N'i kasutada ainult koos kondoomiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Koostoimeid teiste ravimitega pole teada.

Teiste tupesiseselt manustatavate ravimite samaaegne kasutamine pole soovitatav.

Patentex oval N'i võib kasutada koos kondoomiga.

Patentex oval N kasutamine koos toidu ja joogiga

Pole asjakohane

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Patentex oval N'i kasutamine pole raseduse ajal näidustatud. Ohutuse mõttes ei tohi Patentex oval N'i kasutada lohhiate (sünnitusjärgsete vooluste) ajal.

Patentex oval N'i toime rinnaga toidetavale imikule pole teada, seetõttu ei tohi Patentex oval N'i imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine



Pole asjakohane.

3. KUIDAS PATENTEX OVAL N'i KASUTADA

Kasutage Patentex oval N'i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaliselt kasutatakse Patentex oval N'i järgmiselt:

1. Sisestada vaginaalsuposiit ühe sõrme pikkuselt tuppe vähemalt kümme minutit enne vahekorda.



2. Kui ejakulatsiooni (seemnepurset) ei ole tunni aja jooksul toimunud, on soovitatav asetada lisaks teine vaginaalsuposiit vaatamata sellele, et vaginaalsuposiidi toime kestab kuni kaks tundi.

3. Enne järgmist vahekorda tuleb olenemata vahepealse aja pikkusest sisestada uus vaginaalsuposiit. Oodata jälle kümme minutit.

Kui teil on tunne, et Patentex oval N toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Patentex oval N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Patentex oval N'i kasutamisel võib ilmneda tupe või peenise soojatunne; lokaalne ärritus nagu näiteks valulikkus, voolus, kuivus või põletustunne tupes, valulik urineerimine.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS PATENTEX OVAL N'i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitada temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage Patentex oval N'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Mida Patentex oval N sisaldab:

- Toimeaine on nonoksinool. Üks 3,15 g vaginaalsuposiit sisaldab 75 mg nonoksinooli.
- Abiained on polüetüleenglükool (makrogool) 1500, polüetüleenglükool (makrogool) 1000, naatriumvesinikkarbonaat, naatriumlaurüülsulfaat, viinhape.

Kuidas Patentex oval N välja näeb ja pakendi sisu

Valged vaginaalsuposiidid. Pakendis vastavalt 6 või 12 vaginaalsuposiiti blisterribal.

Müügiloa hoidja ja tootja

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt am Main
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH
Pirita tee 20T
10127 Tallinn
Tel. 646 0980

Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2012