

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cuplaton 317,5 mg/ml suukaudsed tilgad, emulsioon simetikoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Cuplaton ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cuplaton'i võtmist
3. Kuidas Cuplaton'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cuplaton'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Cuplaton ja milleks seda kasutatakse

Cuplaton suukaudsete tilgade toimeaine simetikoon lagundab gaasimullid vähendades pindpinevust ning hõlbustab seega gaaside eritumist. Cuplaton leevendab kõhupuhitust ja sellest tingitud valulikkust.

Simetikoon ei imendu seedetraktist.

Cuplaton'i kasutatakse:

- Kõhupuhituse (üleliigne gaas maos ja sooles) sümptomaatiliseks raviks.
- Täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Cuplaton'i kasutamist

Cuplaton'i ei tohi kasutada

- kui olete simetikooni või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Muud ravimid ja Cuplaton

Cuplaton'il koostoimed teiste ravimitega puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Cuplaton'i võib kasutada raseduse ja imetamise ajal, kuna simetikoon ei läbi platsentaarbarjääri ja ei eritu rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Simetikoon ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

Cuplaton suukaudsed tilgad sisaldavad naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt "naatriumivaba".

3. Kuidas Cuplaton'i võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanutele ja üle 10-aastastele lastele:

- Kõhupuhituse raviks 5 tilka 4 korda ööpäevas.

- Diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks manustatakse 2...3 päeva enne uuringut 12 tilka 4 korda ööpäevas.

Lastele:

0-6 elukuul kõhupuhitusest tingitud koolikute (tugevad valuhood) raviks 2-4 tilka vähesesse vedelikku segatuna enne iga söögikorda.

Kõhupuhituse raviks:

Vanus	Annus
½...1 aastased	1 tilk 4 korda ööpäevas
1...2 aastased	1...2 tilka 4 korda ööpäevas
2...4 aastased	2 tilka 4 korda ööpäevas
4...6 aastased	3 tilka 4 korda ööpäevas
6...10 aastased	4 tilka 4 korda ööpäevas

1 ml = 35 tilka.

Enne kasutamist loksutada.

Kui Teil on tunne, et Cuplaton'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Cuplaton'i rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teatatud.

Kui te unustate Cuplaton'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Simetikooni kasutamisel on väga harva teatatud allergilistest nähtudest, nagu lööbest ja urtikaariast (nõgestõbi).

Harva on teatatud ka seedetrakti nähtudest, nagu kõhuvalust ja kõhu puhitusest.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Cuplaton'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 3 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cuplaton sisaldab

- Toimeaine on simetikoon. 1 ml sisaldab 317,5 mg simetikooni.
- Teised koostisosad on glütseroolmonostearaat, polüoksüetüleen (100) stearaat, kolloidne veevaba rändioksiid, sorbiinhape, naatriumsahhariin, ja puhastatud vesi.

Kuidas Cuplaton välja näeb ja pakendi sisu

MDPE plastikpudel, millel on LDPE plastikotsik (LD-polüetüleen) ja HDPE plastikkork või HDPE plastikpudel, millel on LDPE plastikotsik ja PP plastikkork. Valge või kollakas emulsioon.

30 ml plastikpudelis.

Müügiloa hoidja

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Tootja

Orion Corporation
Orion Pharma
Volltikatu 8
FI-70700 Kuopio
Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Orion Pharma Eesti OÜ
Mustamäe tee 6b
10621 Tallinn, Eesti
Tel: + 372 66 44 550
E-post: orionpharmaeesti@orionpharma.com

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2021.