

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Espumisan L 40 mg/ml suukaudsed tilgad, emulsioon simetikoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Espumisan L milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Espumisan L'i kasutamist
3. Kuidas Espumisan L'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Espumisan L'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Espumisan L ja milleks seda kasutatakse

Espumisan L kuulub ravimite gruppi mida nimetatakse seedetrakti ravimiteks. Selle toimeaine simetikoon lagundab toidumassis ja seedetrakti limas olevaid gaasimulle. Vabanenud gaas imendub sooleseinas ja eraldub soole motoorikaga.

- Kasutatakse gaasi kogunemisega seotud mao- ja soolekaebuste korral, mille sümptomiteks on kõhupuhitus.
- Täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute (nt röntgen-, ultraheli- või gastroskoopilised uuringud) ettevalmistamiseks.
- Pesuvahendite eksliku sissevõtmise järgselt abistava vahendina vahu vähendamiseks seedetraktis.

2. Mida on vaja teada enne Espumisan L'i kasutamist**Espumisan L'i ei tohi kasutada:**

- kui olete simetikooni või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Espumisan L'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Gaasi kogunemisest tingitud kaebused võivad olla ka mao ja soolestiku mõne muu, tõsisema haiguse sümptomid.

Selliste sümptomite, nagu:

- pinge- ja täiskõhutunne;
- gaasi eraldumine suu kaudu;
- kõhu "korisemine";
- mao venitus (liigest gaasist)

esinemisel või püsimisel tuleb pöörduda arsti poole. Arst uurib kaebuste põhjust, välistades haiguse olemasolu, mis võiks vajada teistsugust ravi.

Muud ravimid ja Espumisan L

Siiani ei ole täheldatud Espumisan L'il koostoimeid teiste ravimitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Espumisan L'i võtmise kohta raseduse ja imetamise ajal ei ole mingeid piiranguid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Erijuhised puuduvad.

Espumisan L sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23mg) naatriumi milliliitri kohta, so põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Espumisan L'i kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kasutamine

Enne kasutamist loksuta pudelit. Tilgutamiseks hoi a pudeli põhi ülespoole. 25 tilka (1 ml suukaudset emulsiooni) sisaldab 40 mg simetikooni.

Annustamine

Tavaline annus on:

Seedetrakti gaasivaevustega seotud sümptomite ravi

Näiteks kõhupuhituse korral

Vanus	Annus tilkades (ml)	Kasutamise sagedus
Imikud	25 tilka (võrdne 1 ml-ga) igal toidukorral toidupudelisse või andke lapsele enne või pärast imetamist	
Lapsed vanuses 1...6 aastat	25 tilka (võrdne 1 ml-ga)	3...5 korda päevas
Lapsed vanuses 6...14 aastat	25 kuni 50 tilka (võrdne 1...2 ml-ga)	3...5 korda päevas
Noorukid üle 14 eluaasta ja täiskasvanud	50 tilka (võrdne 2 ml-ga)	3...5 korda päevas

Märkus: Espumisan L'i võib kasutada ka pärast operatsiooni.

Espumisan L'i võetakse söögi ajal või pärast sööki, vajadusel ka enne magamaminekut.

Ravi kestuse määrab kaebuste kulg.

Vajadusel võib Espumisan L'i kasutada pikema aja vältel. Kui kaebused püsivad vt lõik 2 "Hoiatused ja ettevaatusabinõud"

Seedetrakti diagnostilisteks uuringuteks ettevalmistamine:

Röntgen- ja ultraheliuuringud

Uuringule eelneval päeval	Uuringupäeva hommikul
50 tilka (vastab 2 ml-le) 3 korda päevas	50 tilka (vastab 2 ml-le)

Lisandina kontrastaine suspensioonile (seedetrakti diagnostilistel uuringutel):

100...200 tilka (vastab 4...8 ml-le) Espumisan L'i lisaks 1 liitrile suukaudsele kontrastainele radiograafia puhul.

Antidoodina (vastumürgina) mürgistuse korral pesuvahenditega :

Sõltuvalt mürgistuse raskusastmest.

Vanus	Annus
Lapsed	65 tilka kuni 1/3 pudelit (vastab 2,5...10 ml-le) Espumisan L'i.
Täiskasvanud	1/3...2/3 pudelit (vastab 10...20 ml-le) Espumisan L'i).

Tähelepanu!

Kui te kasutate Espumisan L'i esmaabivahendina pärast pesuvahendi neelamist tuleb minna **otsekohe** arsti juurde!

Kui teil on tunne, et Espumisan L'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Espumisan L'i rohkem kui ette nähtud

Mürgistusjuhte Espumisan L'i võtmisel ei ole teada.

Espumisan L'i toimeaine simetikoon lagundab seedetraktis oleva vahu füüsikaliselt ja on bioloogiliselt ning keemiliselt täiesti inaktiivne. Seetõttu on mürgistus praktiliselt välistatud. Ka suured Espumisan L'i annused on hästi talutavad.

Kui te unustate Espumisan L'i kasutada

Võite võtta järgmise annuse mistahes teile sobival ajal.

Kui te lõpetate Espumisan L'i kasutamise

Pärast Espumisan L'i kasutamise lõpetamist võivad ilmnedä sümptomid uuesti.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Siiani ei ole Espumisan L'il kõrvaltoimeid täheldatud.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitade saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Espumisan L'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Märkus stabiilsuse kohta pärast esmast avamist

Pärast pudeli esmakordset avamist on Espumisan L kasutamiskõlblik 6 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Espumisan L sisaldab

- Toimeaine on simetikoon. 25 tilka (1 ml suukaudset emulsiooni) sisaldab 40 mg simetikooni.
- Abiained on makrogoolsteraat, glütseroolmonostearaat 40-55, sorbiinhape, naatriumhüdrokksiid, naatriumkloriid, karbomeerid, naatriumtsitraat, sukraloos, puhastatud vesi

Kuidas Espumisan L välja näeb ja pakendi sisu

Piimjas valge kuni kollakas, väheviskoosne emulsioon.

Espumisan L on saadaval 30 ml merevaiguvärvi klaasist pudelis, mis on suletud pakendi avamist tuvastada võimaldava polüpropüleenist korgiga, millel on murtav rõngas ja polüpropüleenist tilguti.

1 või 3 pudelit karbis.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja:

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicke Weg 125
12489 Berliin, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt 29
10612 Tallinn
Eesti
Tel: 667 5001

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2021.