

## PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

*Dermilon Paste* , 220 mg/g nahapasta  
Tsinkoksiid

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on *Dermilon Paste* ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne *Dermilon Paste* kasutamist
3. Kuidas *Dermilon Paste*'t kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas *Dermilon Paste*'t säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

## **1. MIS RAVIM ON *DERMILON PASTE* JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

*Dermilon Paste* on tsinkoksiidi nahapasta, mida kasutatakse kergete nahapõletike raviks ja mähkmedermatiidi korral.

Märkus: *Dermilon Paste* nahapastat sobib kasutada nt ekseemide, nahalõhede, lamatiste, haavandite ja nahapõletuste (sh päikesepõletuste) ning vigastuste korral.

## **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE *DERMILON PASTE* KASUTAMIST**

### **Ärge kasutage *Dermilon Paste*'t, kui:**

- te olete ülitundlik (allergiline) toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes.

### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Tuleb vältida *Dermilon Paste* nahapasta sattumist silmadesse või nende ümbrusse.

Kui kaebused püsivad või oodatavat paranemist ei toimu, tuleb konsulteerida arstiga.

Ravimi koostises olev lanoliin võib põhjustada lokaalselt nahareaktsioone (kontaktdermatiit).

### **Muud ravimid ja *Dermilon Paste***

Koostoimeid teiste ravimitega pole siiani teada.

Palun informeerige oma arsti, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetuid ravimeid.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Teadaolevad riskid puuduvad. Raseduse ja imetamise ajal võib ravimit kasutada vastavalt näidustusele (vt punkt 1). Imetamise ajal vältida ravimi määrimist rinnanibude piirkonda. Halva lahustuvuse ja imendumise tõttu ei avalda ravim toimet viljakusele.

**Autojuhtimine ja masinatega töötamine:**

Ei ole täheldatud mõju reaktsioonikiirusele.

### **3. KUIDAS DERMILON PASTE'T KASUTADA**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitav annus on: nahapasta kanda 1...3 korda päevas kahjustatud nahale või määrida nahapasta sidemele ja katta sellega nahk. Sidet vahetada üle päeva. Kui esineb tugev mädaeritus või haavaeritis, tuleb sidet vahetada iga päev.

**Kasutamine lastel ja noorukitel**

*Dermilon Pastet* võib kasutada vanematel kui 2 päevastel lastel. Nahapasta kanda 1...3 korda päevas kahjustatud nahale või määrida nahapasta sidemele ja katta sellega nahk.

**Kui te kasutate *Dermilon Paste't* rohkem kui ette nähtud**

Üleannustamise juhtumitest pole teatatud

**Kui te unustate *Dermilon Paste't* kasutada**

Ärge kasutage topelt annust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata.

**Kui te lõpetate *Dermilon Paste* kasutamise**

Te võite lõpetada *Dermilon Paste* kasutamise igal ajal. Soovitav on siiski konsulteerida oma arsti või apteekriga alternatiivse ravi vajaduse suhtes.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Ülitundlikkuse esinemisel nahapasta koostisosade suhtes võivad esineda allergilised reaktsioonid.

Ravimi koostises olev lanoliin võib põhjustada lokaalselt nahareaktsioone (kontaktdermatiit).

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, lõpetage *Dermilon Paste* kasutamine ja informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

**Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. KUIDAS DERMILON PASTE'T SÄILITADA**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage *Dermilon Paste*'t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

## **6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE**

### **Mida *DERMILON PASTE* sisaldab**

Toimeaine on: 1 g nahapastat sisaldab 220 mg tsinkoksiidi.

100 g nahapastat sisaldab 22 g tsinkoksiidi.

Abiained on talk, valge savi, vedel lanoliin, isopropüülmüristaat, oliiviõli, alumiiniumstearaat, kolloidne ränidioksiid, kastoorõli, valge vaseliin, lavendliõli, sidruniõli, kalamaksaõli.

### **Kuidas *DERMILON PASTE* välja näeb ja pakendi sisu**

Valge, pehmet konsistentsi nahapasta 60, 120 g alumiiniumtuubis.

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG

Braunmattstrasse 20

76532 Baden-Baden

Saksamaa

Phone: +49 (0)7221 95400

Fax: +49 (0)7221 54 026

E-Mail: cesra@cesra.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

### **Müügiloa hoidja esindaja Eestis:**

Miecys-Pharm OÜ

Vitamiini 4

Tartu 51014

Eesti

tel/fax +372-7380676

**Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2014**