

## **Pakendi infoleht: teave patsiendile**

### **Cardiopyrin, 75 mg gastroresistentsed tabletid** atsetüülsalitsüülhape

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma Cardiopyrin'i täpselt juhistele vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arstiga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Cardiopyrin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cardiopyrin'i võtmist
3. Kuidas Cardiopyrin'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cardiopyrin'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Cardiopyrin ja milleks seda kasutatakse**

Cardiopyrin'i toimeaine atsetüülsalitsüülhape omab vereliistakute agregatsiooni vastaseid omadusi ning seetõttu vähendab verehüüvete (veresoonte tromboosi) tekkimise ohtu. Gastroresistentsetel tablettidel on spetsiaalne õhuke polümeerkate, mis erinevalt tavalistest tablettidest, ei lahustu maos, vaid hoopis peensooles. Seega ärritavad need tabletid vähem seedetrakti kui tavalised tabletid.

Cardiopyrin'i kasutatakse järgmistel juhtudel:

Koronaartromboosi (pärgarteri umbumus) profülaktika

- müokardiinfarkti kahtluse korral ja järgselt;
- stenokardia (valud rindkeres) korral;
- pärast südame pärgarterite revaskularisatsiooni (veresoonte ja seejärel vereringe taastamine) protseduuri;
- esmase müokardiinfarkti riski vähendamine kardiovaskulaarsete (südame-veresoonkonna) riskitegurite kaasnemisel.

Ajuarterite tromboosi (trombi teke) profülaktika

- mööduva ajuisheemia (aju väheveresus) järgselt;

#### **2. Mida on vaja teada enne Cardiopyrin'i võtmist**

##### **Cardiopyrin'i ei tohi võtta**

- kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüülsalitsüülhappe, Cardiopyrin'i mõne koostisosa või salitsülaatide või teiste nendesarnaste ainete suhtes;
- kui teil esinevad mao- või soolehaavandid;
- kui teil esineb eelsoodumus verejooksudele (hemorraagiline diatees), vereliistakute vähesus (trombotsütopeenia) või hemofiilia (vere hüübimatus);

- kui teil esineb neerupuudulikkus või neerukivid (oksalaatide sisaldus uriinis);
- kui te olete raseduse viimases kolmandikus ning arst on teile määranud rohkem kui 100 mg Cardiopyrin'i ööpäevas.

### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

- kui teil seisab ees plaaniline kirurgiline protseduur, tuleb arvesse võtta selle ravimi tromboosivastast toimet.
- kui osutub vajalikuks teiste salitsülaatide või nn mittesteroidsete põletikuvastaste/reumavastaste ravimite (valu- ja põletikuliste protsesside vastaste ravimite) samaaegne kasutamine. Seda otsustab arst.
- kui te kasutate Cardiopyrin'i suuremates annustes paljude aastate jooksul, sest see võib põhjustada neerukahjustust.
- kui teil esineb teadaolev ülitundlikkus teiste valuvaigistite ja reumaatiliste haiguste vastaste ravimite suhtes, bronhiaalastma, hemolüütiline aneemia, seedetrakti haigused nt gastriit või maksa- ja/või neerufunktsiooni häire. Kui teil esineb mõni neist seisunditest, siis rääkige sellest arstile. Kui teil esineb pikema perioodi vältel lakkamatu oksendamine, vedelikuvaegus, teadvusehäire ja krambid, siis pöörduge otsekohe arsti poole.

### **Lapsed**

Cardiopyrin on vastunäidustatud lastele ja noorukitele, kuna atsetüülsalitsüülhappe (Cardiopyrin'i toimeaine) kasutamise ajal on üksikjuhtudel esinenud Reye' sündroomi (eluohulik tüsistus, mida iseloomustab kauakestev oksendamine, dehüdratsioon e vedelikuvaegus, teadvuse häire ja krambid).

### **Muud ravimid ja Cardiopyrin**

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ravi toime võib olla mõjutatud kui Cardiopyrin'i kasutatakse samaaegselt teiste ravimitega nagu:

- veretrombide teket vähendavad ravimid (nt varfariin ja teised kumariini derivaadid, hepariin, dipüridamool, sulfiinpüraasoon)
- transplantatsiooni järgselt organi äratõukereaktsiooni vähendavad ravimid (tsüklosporiin, takroliimus)
- kõrge vererõhu raviks (nt diureetikumid ja AKE inhibiitorid)
- valu ja põletiku raviks (nt kortikosteroidid või põletikuvastased ravimid)
- podagra raviks (probenetsiid, sulfiinpüraasoon)
- vähktõve või reumatoidartriidi raviks (metotreksaat)
- veresuhkrutaseme langetamiseks ravimid (sulfonüüluurea)

Digoksiini, barbituraatide ja liitiumi kontsentratsioon veres võib tõusta.

Pikaajalisel antatsiidide ja H<sub>2</sub>-retseptori blokaatorite (liigse maohappe hulga raviks) kasutamisel võib olla vajalik Cardiopyrin'i annuse suurendamine.

Samaaegse tetratsükliinide rühma ravimi (kasutatakse infektsioonhaiguste raviks) kasutamisel peab manustamise vahele jääma vähemalt 1...3-tunnine vaheaeg.

Metamisool (valu ja palavikku leevendav aine) võib samaaegsel manustamisel vähendada atsetüülsalitsüülhappe mõju trombotsüütide agregatsioonile (vereliistakute kokkukleepumine ja verehüübe moodustumine). Seetõttu peab olema ettevaatlik, kasutades sellist kombinatsiooni patsientidel, kes manustavad atsetüülsalitsüülhapet väikeses annuses südame kaitseks.

Enne Cardiopyrin'i kasutamist pidage nõu oma arstiga. Cardiopyrin'i pideva kasutamise korral pidage eelnevalt nõu oma arstiga kui plaanite võtta teisi ravimeid (sh ilma retseptita müüdadavad ravimid).

### **Cardiopyrin koos toidu ja joogiga**

Cardiopyrin'i kasutamine koos alkoholiga võib suurendada seedetrakti verejooksu ohtu.

### **Rasedus ja imetamine**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Cardiopyrin võib häirida rasestumist. Kui te kavatsete rasestuda või teil on probleeme seoses rasestumisega, siis rääkige sellest arstile.

Raseduse viimase kolme kuu jooksul ei tohi Cardiopyrin'i kasutada, kuna see võib põhjustada nii emal kui vastsündinul sünnituse käigus pikaajalist verejooksu. Raseduse esimesel kuul kuul ja imetamise perioodil tohib Cardiopyrin'i kasutada ainult tungival vajadusel.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet mõjutavaid toimeid ei ole oodata.

### **Cardiopyrin sisaldab laktoosi**

Üks Cardiopyrin'i tablett sisaldab 45 mg laktoosmonohüdraati. Kui te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

## **3. Kuidas Cardiopyrini võtta**

Gastroresistentsed tabletid tuleb koos vedelikuga tervelt alla neelata. Cardiopyrin'i tablette ei tohi osadeks murda, kuna see kahjustab ravimi toimet.

Võtke Cardiopyrin'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Atsetüülsalitsüülhappe (ASH) annuseid 75...300 mg (üks kord ööpäevas sisse võtta soovitatakse järgmistel juhtudel:

- stenokardiaga patsientidel südamelihaseinfarkti ohu vähendamiseks;
- südamelihaseinfarkti kordumise profülaktikaks;
- mööduva ajuvereringehäire ja insuldi sekundaarseks profülaktikaks.

ASH annuseid 75...300 mg üks kord ööpäevas sisse võtta soovitatakse tromboosi profülaktikaks pärast südameveresoonte kirurgilist operatsiooni, nt pärgarterite kõrvalühenduse paigaldamist.

Esmase müokardiinfarkti riski vähendamine kardiovaskulaarsete riskitegurite kaasnemisel (nt stenokardia või müokardiinfarkt diabeediga patsientidel):

100...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas. Vajadusel võib arst annust vähendada (75 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas).

Ravi kestuse otsustab arst.

### **Kui te võtate Cardiopyrin'i rohkem kui ette nähtud**

Üleannustamise ja mürgistuse sümptomiteks on iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, peapööritus, helin kõrvus, peavalu, segasus ja hüperventilatsioon (hingeldus). Kui teil esineb mõni neist sümptomitest, palun võtke otsekohe ühendust arstiga.

### **Kui te unustate Cardiopyrin'i võtta**

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata, vaid manustage järgmine annus ettenähtud ajal.

### **Kui te lõpetate Cardiopyrin'i kasutamise**

Enne kui lõpetate Cardiopyrin'i kasutamise, rääkige sellest arstile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka Cardiopyrin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud vastavalt nende raskusastmele ja esinemissagedusele:

<b>Väga sage:</b>	esinevad rohkem kui 1-l patsiendil 10-st
<b>Sage:</b>	esinevad rohkem kui 1-l patsiendil 100-st, kuid vähem kui 1-l patsiendil 10-st
<b>Aeg-ajalt:</b>	esinevad rohkem kui 1-l patsiendil 1000-st, kuid vähem kui 1-l patsiendil 100-st
<b>Harv:</b>	esinevad rohkem kui 1-l patsiendil 10000-st, kuid vähem kui 1-l patsiendil 1000-st.
<b>Väga harv:</b>	esinevad vähem kui 1-l patsiendil 10000-st, sh üksikjuhud.

#### *Vere ja lümfisüsteemi häired*

Harv: veritsusaja pikenemine, trombotsütopeenia (vereliistakute arvu vähenemine veres).

#### *Immuunsüsteemi häired:*

Harv: ülitundlikkusreaktsioonid, nt õhupuudus ja nahareaktsioonid.

#### *Kõrva ja labürindi kahjustused:*

Harv: suuremate annuste sissevõtmine võib põhjustada peapööritust ja helinat kõrvus.

#### *Hingamise, rindkere ja keskseinandi häired*

Harv: astmahoo vallandumine.

#### *Seedetrakti häired*

Harv: iiveldus, oksendamine, varjatud seedetrakti veritsus, mis harvadel juhtudel võib põhjustada rauavaegust. Suuremate annuste manustamine võib põhjustada seedetrakti haavandeid, millega kaasnevad rasked verejooksud (helepunane või kohvipaksu meenutav okse, musta värvi iste).

#### *Maksa ja sapiteede häired*

Harv: suuremate annuste manustamine pikemate perioodide vältel võib põhjustada maksakahjustust.

#### *Neerude ja kuseteede häired*

Harv: suuremate annuste manustamine pikemate perioodide vältel võib põhjustada neerukahjustust.

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Cardiopyrini säilitada**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 C. Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Cardiopyrin'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Cardiopyrin sisaldab**

- Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. Üks gastroresistentne tablett sisaldab 75 mg atsetüülsalitsüülhapet.
- Abiained on laktoosmonohüdraat (45 mg), mikrokristalliline tselluloos, kolloidne ränidioksiid, veevaba, kartulitärklis, talk, glütserooltriatsetaat, metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) 30 % dispersioon.

### **Kuidas Cardiopyrin välja näeb ja pakendi sisu**

Cardiopyrin 75 mg gastroresistentsed tabletid on valged, ümmargused ja kaksikkumerad tabletid.

PVC/alumiiniumblister.

Pakendis 30 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

### **Müügiloo hoidja ja tootja**

#### Müügiloo hoidja

G.L. Pharma GmbH  
Schlossplatz 1  
8502 Lannach  
Austria

#### Tootja:

Lannacher Heilmittel GmbH  
Schlossplatz 1  
A-8502 Lannach  
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja poole

Covalent OÜ

Lõõtsa 8

Tallinn 11415

Eesti

Tel: +3726600945, fax: +3726600946

**Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2020.**