

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Iodine Valentis 50 mg/ml nahalahus Jood

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Iodine Valentis ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Iodine Valentis'e kasutamist
3. Kuidas Iodine Valentis't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Iodine Valentis't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Iodine Valentis ja milleks seda kasutatakse.

Iodine Valentis'e toimeaine on jood, millel on antiseptilised omadused.

Joodi nahalahust kasutatakse naha desinfitseerimiseks (puhastamine mikroobidest) (nt teatud nahahaigused, kirurgiliste operatsioonihaavade servad).

2. Mida on vaja teada enne Iodine Valentis'e kasutamist

Ärge kasutage Iodine Valentis't:

- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- lahtistel haavadel;
- kui teil on ekseem.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

- kui teil on kilpnäärmehaigus;
- olge ettevaatlik, et see ei satuks silma, suhu ega limaskestadele. Sellisel juhul tuleb silmi ja limaskesti hoolikalt veega loputada.
- pärast joodi nahale kandmist ei tohi nahale asetada oklusioonsidet;
- Iodine Valentis võib riideid märida.

Muud ravimid ja Iodine Valentis

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Joodipreparaatide kasutamine koos kloorheksidiini, hõbesulfadiasiini ja/või aluseid sisaldavate ravimitega võib nõrgendada selle paikset toimet.

Iodine Valentis võib tugevdada kilpnäärmefunktsiooni pärssivate ravimite toimet.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal tohib joodipreparaate kasutada lühikest aega ja ettevaatusega.

Kuna jood eritub rinnapiima, võib see pärssida vastsündinul kilpnäärme funktsiooni. Seetõttu joodipreparaadi kasutamine kauem kui nädala jooksul ei ole soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

3. Kuidas Iodine Valentis't kasutada.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutada välispidiselt nahal.

Kandke ravimit kahjustatud nahapiirkonnale vastavalt vajadusele.

Kasutamine lastel

Spetsiaalne annustamine lastele ei ole vajalik.

Kui te kasutate Iodine Valentis't rohkem kui ette nähtud

Iodine Valentis'e lühiajalisel paigal kasutamisel nahal on üleannustamine ebatõenäoline.

Kui teie või keegi teine neelab Iodine Valentis't kogemata alla, pöörduge arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on defineeritud järgmiselt:

Väga sage:	esineb enam kui 1 kasutajal 10-st;
Sage	esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt	esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st
Harv	esineb 1 kuni 10 kasutajal 10000-st
Väga harv	esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st;
Teadmata	ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Harva esinevad kõrvaltoimed

Nahaärritus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Iodine Valentis'e üleliigsel kasutamisel võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (nahalööve, riniit, angioneurootiline turse, süljenäärmete turse).

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed

Kontakttekseem.

Iodine Valentis'e pikaajalisel kasutamisel võib joodi imendumise tõttu pärssuda (pidurduda) kilpnäärme ja hüpofüüsi aktiivsus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Iodine Valentist säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Iodine Valentis sisaldab:

- Toimeaine on jood. 1 ml lahust sisaldab 50 mg joodi.
- Abiained on kaaliumjodiid, etanool (95 %) ja puhastatud vesi.

Kuidas Iodine Valentis välja näeb ja pakendi sisu

Selge, punakaspruun iseloomuliku lõhnaga lahus.

10 ml või 20 ml tume klaaspudel.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

UAB „Valentis“

Molėtų pl. 11

08409 Vilnius

Leedu

Tel: +370 5270 1225

Faks: +370 5270 1223

Tootja:

UAB „Valentis“

Taikos pr. 102

51195 Kaunas

Leedu

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS“Paira“

Pae 8

11414 Tallinn

Tel: +372 6035764

Faks: +372 6002467

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2016