

## Pakendi infoleht: teave patsiendile

### Atorvastatiin/Amlodipiin Krka, 10 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Atorvastatiin/Amlodipiin Krka, 10 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Atorvastatiin, amlodipiin

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Atorvastatiin/Amlodipiin Krka ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Atorvastatiin/Amlodipiin Krka võtmist
3. Kuidas Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### 1. Mis ravim on Atorvastatiin/Amlodipiin Krka ja milleks seda kasutatakse

Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't kasutatakse südame ja veresoonte haiguste (nt stenokardia, südamelihase infarkt) vältimiseks kõrge vererõhuga patsientidel, kellel on täiendavad kardiovaskulaarsed riskitegurid, nagu suitsetamine, ülekaalulisus, veres suurenenud kolesteroolisisaldus, perekonna anamneesis südamehaigus või diabeet. Nimetatud riskitegurite ja kõrge vererõhuga seoses on patsientidel suurenenud risk südame ja veresoonte haiguste tekkeks.

Atorvastatiin/Amlodipiin Krka on ravim, mis sisaldab kahte toimeainet, amlodipiini (kaltsiumi antagonist) ja atorvastatiini (statiin). Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't määratakse siis, kui arst peab vajalikuks mõlemat ravimit. Amlodipiini kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensioon) raviks ja atorvastatiin vähendab kolesterooli sisaldust.

Kõrge vererõhk (hüpertensioon) on haigus, mille puhul vererõhk on püsivalt ebanormaalselt kõrge ja see on üks südame ja veresoonte haiguste (stenokardia, südamelihase infarkt, insult) riskitegur.

Kolesterool on organismis loomulikult esinev aine, mis on vajalik normaalseks kasvuks. Siiski, kui veres on liiga palju kolesterooli, võib see ladestuda veresoonte seintele, mistõttu suureneb risk trombide ning südame ja veresoonte haiguste tekkeks. See on üks peamisi südamehaiguste põhjuseid.

#### 2. Mida on vaja teada enne Atorvastatiin/Amlodipiin Krka võtmist

##### Ärge võtke Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't:

- kui olete amlodipiini või atorvastatiini või mis tahes muu kaltsiumikanali blokaatori suhtes allergiline;
- kui olete selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on praegu haigus, mis mõjutab maksa (kui olete varem põdenud haigust, mis mõjutab maksa, vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
- kui teie vereanalüüsides on ilmnunud seletamata põhjusel kõrvalekaldeid maksafunktsiooni näitajates;
- kui olete rase, püüate rasestuda või toidate last rinnaga;

- kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest: ketokonasool, itrakonasool (seeninfektsioonide või mükoosi raviks kasutatavad ravimid), telitromütsiin (antibiootikum);
- kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon);
- kui teil esineb südame aordiklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, mil teie süda ei ole võimeline kehasse piisavalt verd pumpama);
- kui teil on südameinfarkti järgselt tekkinud südamepuudulikkus;
- kui te kasutate C-hepatiidi ravimisel glekapreviiri/pibrentasviiri kombinatsiooni.

### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Atorvastatiin/Amlodipiin Krka võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on neeruprobleemid;
- kui teil on kilpnäärme alatalitus (hüpotüreoidism);
- kui teil on esinenud korduvaid või seletamatuid lihaskrampe või kui teil või teie perekonnas on esinenud pärilikke lihaseprobleeme. Samuti teavitage oma arsti või apteekrit, kui teil on püsiv lihaskrampe. Selle diagnoosimiseks või raviks võivad vajalikud olla täiendavad uuringud ja ravimid;
- kui teil on ravi ajal teiste kolesteroolisisaldust (lipiidide sisaldust) vähendavate ravimitega (st teiste statiinide või fibraatidega) esinenud probleeme lihastega;
- kui te tarvitate regulaarselt suurtes kogustes alkoholi;
- kui olete põdenud haigust, mis mõjutas maksa;
- kui olete üle 70 aasta vana;
- kui teil on olnud ajusisese verejooksuga insult või kui teil on varasematest insultidest jäänud ajju väikesed vedelikukogumid.
- kui te võtate või olete viimase 7 päeva jooksul võtnud suukaudselt või saanud süstina ravimit, mida nimetatakse fusidiinhappeks (bakteriaalse infektsiooni ravim). Fusidiinhape ja Atorvastatiin/Amlodipiin Krka kombinatsioon võib põhjustada tõsiseid lihaseprobleeme (rabdomüolüüs).

### **Enne Atorvastatiin/Amlodipiin Krka võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga**

- kui teil on raske hingamispuudulikkus.

Kui teil on mõni ülalmainitud seisunditest, peab teie arst enne ravi alustamist Atorvastatiin/Amlodipiin Krkaga ja võimalik, et ka selle ajal, tegema vereproovi lihastega seotud kõrvaltoimete ennetamiseks. On teada, et lihastega seotud kõrvaltoimete, nt rabdomüolüüsi risk suureneb mõnede teiste ravimite samaaegsel tarvitamisel (vt „Muud ravimid ja Atorvastatiin/Amlodipiin Krka“).

Kui teil on suhkurtõbi või risk suhkurtõve tekkeks, jälgib teie arst teid selle ravimi võtmise ajal hoolikalt. Tõenäoliselt on teil risk suhkurtõve tekkeks, kui teil on veres kõrge suhkru- ja rasvasisaldus, te olete ülekaaluline ning teil on kõrge vererõhk.

### **Lapsed ja noorukid**

Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

### **Muud ravimid ja Atorvastatiin/Amlodipiin Krka**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Mõnedel ravimitel võivad tekkida Atorvastatiin/Amlodipiin Krka'ga koostoimed. Koostoime võib vähendada ühe või mõlema ravimi tõhusust. Teise võimalusena võib see suurendada kõrvaltoimete, sealhulgas rabdomüolüüsiks nimetatava lihaste kõhetumise ja müopaatia (kirjeldatud lõigus 4) riski ning raskusastet:

- mõned antibiootikumid, näiteks rifampitsiin, või makroliidantibiootikumid, näiteks erütromütsiin, klaritromütsiin, telitromütsiin, fusidiinhape, või mõned ravimid, mida kasutatakse seennakkuste ravimiseks, näiteks ketokonasool, itrakonasool;
- lipiidide sisalduse vähendamiseks kasutatavad ravimid: fibraadid (nt gemfibrosiil) või kolestipool;
- südamerütmi reguleerivad ravimid, näiteks amiodaroon, diltiaseem ja verapamiil;

- krambivastased ravimid nagu karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoin, fosfenütoin, primidoon;
- immuunsüsteemi talitlust mõjutavad ravimid nagu tsüklosporiin, takroliimus, siroliimus, temsiroliimus, everoliimus;
- HIV-i raviks kasutatavad ravimid, nagu ritonaviir, lopinaviir, atasanaviir, indinaviir, darunaviir, tipranaviiri/ritonaviiri kombinatsioon, nelfinaviir jt;
- mõned C-hepatiidi raviks kasutatavad ravimid, nt telapreviir, botsepreviir ja elbasviiri/grasopreviiri kombinatsioon;
- depressiooniravimid, nt nefasodoon ja imipramiin;
- psüühikahäirete ravimid, nt neuroleptikumid;
- südamepuudulikkuse ravimid, nt beetablokaatorid;
- kõrge vererõhu ravimid, nt angiotensiin II antagonistid, AKE inhibiitorid, verapamiil ja diureetikumid;
- kõrge vererõhu ja eesnäärme raviks kasutatavad alfablokaatorid;
- muud ravimid, mis tekitavad teadaolevalt Atorvastatiin/Amlodipiin Krka'ga koostoimeid, on esetimiib (langetab kolesterooli), varfariin (vähendab vere hüübimist), suukaudsed rasestumisvastased ravimid, stiripentool (krambivastane ravim epilepsia puhul), tsimetidiin (kõrvetiste ja peptiliste haavandite ravi), fenasoon (valuvaigisti), kolhitsiin (kasutatakse podagra raviks) ja antatsiidid (alumiiniumi või magneesiumi sisaldavad seedehäirete ravimid);
- amifostiin (vähiravim);
- sildenafil (ereksioonihäirete ravim);
- dantroleen ja baklofeen (lihaskramplid);
- steroidid;
- tsüklosporiin (immunosupressant);
- käsimüügiravimite naistepunaürt;
- kui te peate bakteriaalse infektsiooni raviks võtma suukaudselt fusidiinhapet, peate te ajutiselt katkestama selle ravimi võtmise. Teie arst ütleb teile, millal on ohutu ravi Atorvastatiin/Amlodipiin Krka'ga uuesti alustada. Atorvastatiin/Amlodipiin Krka võtmine koos fusidiinhappega võib harvadel juhtudel põhjustada lihaskramplid, -hellust või -valu (rabdomüolüüs). Vt rohkem teavet rabdomüolüüsi kohta lõigust 4.

Atorvastatiin/Amlodipiin Krka võib teie vererõhku veelgi enam rohkem langetada, kui te kasutate juba teisi vererõhu ravimeid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud käsimüügi ravimeid.

### **Atorvastatiin/Amlodipiin Krka koos toidu, joogi ja alkoholiga**

Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't võib võtta ükskõik millal päeva jooksul, koos toiduga või ilma.

#### *Greibimahl*

Ärge jooge rohkem kui üks või kaks klaasi greibimahla päevas, sest suurtes kogustes manustatud greibimahl võib muuta Atorvastatiin/Amlodipiin Krka toimet.

#### *Alkohol*

Atorvastatiin/Amlodipiin Krka kasutamisel vältige liiga suurte alkoholikoguste tarvitamist. Vt täpsemalt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või kavatsete rasestuda, ärge võtke Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't. Viljakas eas naised peavad Atorvastatiin/Amlodipiin Krka või mis tahes ravimi võtmisel kasutama sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid. Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui te tunnete ennast pärast selle ravimi võtmist uimasena.

### **Atorvastatiin/Amlodipiin Krka sisaldab naatriumi**

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes tabletis, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

### **3. Kuidas Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't võtta**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Atorvastatiin/Amlodipiin Krka tavaline algannus täiskasvanutele on üks 5 mg/10 mg tablett ööpäevas. Kui vaja, võib arst Atorvastatiin/Amlodipiin Krka annust suurendada 10 mg/10 mg tabletti ööpäevas.

Atorvastatiin/Amlodipiin Krka tablett tuleb koos veega tervelt alla neelata. Tablette võib suu kaudu võtta ükskõik millal päeva jooksul, koos toiduga või ilma. Püüdke siiski oma tabletti sisse võtta iga päev samal ajal.

Järgige arstilt saadud toitumissoovitusi, eriti piiratud rasvasisaldusega dieedi osas, vältige suitsetamist ja liikuge regulaarselt.

Kui teil on tunne, et Atorvastatiin/Amlodipiin Krka toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### **Kasutamine lastel ja noorukitel**

Selle ravimi kasutamine lastel ja noorukitel ei ole soovitatav.

#### **Kui te võtate Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't rohkem kui ette nähtud**

Kui te olete eksikombel võtnud liiga palju Atorvastatiin/Amlodipiin Krka tablette (rohkem kui teie tavaline ööpäevane annus), võtke ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse. Võtke kaasa kõik pakendisse allesjäänud tabletid ja pakend, nii et haiglapersonal saaks kergesti kindlaks teha, missugust ravimit olete võtnud.

#### **Kui te unustate Atorvastatiin/Amlodipiin Krka't võtta**

Kui te unustate tableti võtta, võtke lihtsalt järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

#### **Kui te lõpetate Atorvastatiin/Amlodipiin Krka võtmise**

Ärge lõpetage Atorvastatiin/Amlodipiin Krka võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta või kui te soovite ravimi võtmise lõpetada, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esinevad ükskõik millised alljärgnevad tõsised kõrvaltoimed või sümptomid, lõpetage Atorvastatiin/Amlodipiin Krka kasutamine ja rääkige sellest kohe oma arstile:

- näo, keele ja kõri turse, mis põhjustab hingamisraskusi;
- seletamatu lihaskramplikus, lihaste hellus, lihaskramplikus või -rebend või uriini värvuse muutumine punakaspruuniks; samal ajal esineb halb enesetunne või kõrge temperatuur (väga harva on nende kõrvaltoimete kombinatsioon muutunud tõsiseks, eluohtlikuks haiguseks, mida nimetatakse rabdomüolüüsiks).

#### **Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):**

- turse käsivarte, käte, säärtel, labajalgade või liigeste piirkonnas.

**Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):**

- allergilised reaktsioonid;
- peavalu (eriti ravi alguses), pearinglus, väsimustunne, unisus;
- südame rütmihäired, nahaõhetus;
- südamepekslemine (oma südamelöökide tundmine);
- hingeldus;
- nina limaskestast põletik, kurguvalu, ninaverejooks;
- iiveldus, kõhuvalu, seedehäired, muutused sooletegevuses (sh kõhulahtisus, kõhukinnisus ja kõhugaasid);
- lihaste ja liigeste valu, lihaste krampid ja spasmid, seljavalu, valu jäsemetes, lihaste väsimus;
- vere suhkrusisalduse suurenemine (kui teil on diabeet, tuleb teil jätkata vere suhkrusisalduse hoolikat jälgimist), kreatiinkinaasi suurenemine veres, vereanalüüsides, mis näitavad maksafunktsiooni, võivad esineda kõrvalekalded;
- probleemid nägemisega (sh kahelinägemine), ähmane nägemine.

**Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):**

- hepatiit (maksapõletik);
- vesine nina, söögiisu kaotus, vere suhkrusisalduse langus (kui teil on suhkurtõbi, jätkake oma vere suhkrusisalduse hoolikat jälgimist), kehakaalu tõus või langus;
- unehäired, luupainajad, meeleolu muutused (sh ärevus), depressioon, treemor (väriseamine), sensoorsete närvid kahjustus (tundlikkuse langus) kätes ja jalgades, mälu kaotus;
- helin või sumin kõrvus, minestamine, suurenenud higistamine, madal vererõhk;
- suukuivus, maitsmismeele muutused, oksendamine, röhitsemine;
- juuste väljalangemine, verevalumid või väikesed laigud nahal, naha värvuse muutused, naha valu- või puutetundlikkuse vähenemine, tuimus või surin sõrmedes ja varvastes, nahalööve, urtikaaria või sügelus;
- kuseteede häired (sh liigne urineerimine öösel ja suurenenud urineerimissagedus), impotentsus, meestel rindade suurenemine;
- ebamugavustunne kehas, pankreatiit (põletik kõhunäärmes põhjustab kõhuvalu), valu, kaelavalu, valu rinnus;
- uriinianalüüsides valgete vereliblede esinemine;
- südame rütmihäired;
- köha.

**Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):**

- nägemishäired;
- ootamatu verejooks või verevalum;
- raske lihasepõletik, väga tugev lihasevalu või krampid, mis võivad väga harva üle minna raskemaks (lihasrakkude hävimine);
- vereliistakute arvu vähenemine veres;
- maksaprobleemid (naha ja silmavalgete kollasus);
- allergilise päritoluga rasked nahareaktsioonid, naha punetus, villidega lööve, naha koorumine, mis võib kiiresti haarata kogu keha ja võib alata gripilaadsete sümptomitega, millega kaasneb kõrge palavik (toksiline epidermaalne nekrolüüs);
- naha sügavamate kihtide turse, sh huulte, silmalaugude ja keele turse; skeetilihaste põletik või turse, villidega lööve, ootamatu tugev turse piirkonna nahas;
- kõõlusepõletik, kõõluste kahjustus;
- segasus.

**Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):**

- allergiline reaktsioon – sümptomiteks võivad olla äkiline hingeldamine ja valu või pigistustunne rinnus, silmalaugude, näo, huulte, suu, keele või kurgu turse, hingamisraskused, kollaps;
- günekomastia (rindade suurenemine meestel);
- vere valgeliblede arvu vähenemine;
- lihaste jäikus või pinges;
- südameinfarkt, väikeste veresoonte põletik, maovalu (gastrit);

- igemete vohamine;
- kuulmise nõrgenemine, maksapuudulikkus;
- valgustundlikkus (naha valgustundlikkus)
- luupusesarnane sündroom (sh nahalööve, liigeste probleemid ja mõju vererakkudele).

#### Muud võimalikud kõrvaltoimed:

- seksuaalfunktsiooni häired;
- depressioon;
- hingamisprobleemid, sealhulgas püsiv köha ja/või hingeldus või palavik;
- kombinatsioon jäikusest, treemorist ja/või liikumishäiretest;
- diabeet. Tõenäoliselt on teil risk suhkurtõve tekkeks, kui teil on veres kõrge suhkru- ja rasvasisaldus, te olete ülekaaluline ning teil on kõrge vererõhk. Arst jälgib teid, kui te võtate seda ravimit;
- püsiv lihasnõrkus.

#### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

#### **5. Kuidas Atorvastatiin/Amlodipiin Krkat säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“.  
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

#### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

##### **Mida Atorvastatiin/Amlodipiin Krka sisaldab**

- Toimeained on amlodipiin ja atorvastatiin.  
Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina) ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).  
Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina) ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).
- Teised koostisosad on:  
*Tableti sisu*  
polüsorbaat 80, kaltsiumkarbonaat, naatriumkroskarmelloos, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, magneesiumstearaat ja kolloidne veevaba ränidioksiid. Vt lõik 2 „Atorvastatiin/Amlodipiin Krka sisaldab naatriumi“.  
*Tableti kate 10 mg/5 mg tablettidel*  
hüpromelloos (6 cp), titaandioksiid (E171), talk ja propüleenglükool (E1520).  
*Tableti kate 10 mg/10 mg tablettidel*  
polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3000, talk ja indigokarmiin (E132).

##### **Kuidas Atorvastatiin/Amlodipiin Krka välja näeb ja pakendi sisu**

Atorvastatiin/Amlodipiin Krka 10 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad, kaldservadega. Tableti mõõdud: ligikaudu 6 mm.

Atorvastatiin/Amlodipiin Krka 10 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on sinised, ümmargused, kaksikkumerad, kaldservadega. Tableti mõõdud: ligikaudu 6 mm.

Tabletid on müügil karpidesse pakituna: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

**Müügiloa hoidja ja tootja**

KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
8501 Novo mesto  
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal  
Pärnu mnt 141  
11314 Tallinn  
Tel. 6671658

**Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2019.**