

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Symbicort, 160 mikrogrammi/4,5 mikrogrammi/pihustuses, inhalatsiooniaerosool, suspensioon Budesoniid, formoteroolfumaraatdihüdraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla teistele kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Symbicort ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Symbicorti kasutamist
3. Kuidas Symbicorti kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Symbicorti säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Symbicort ja milleks seda kasutatakse

Symbicort on inhaleeritav ravim, mida kasutatakse kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) sümptomite raviks 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel. KOK on kopsudes olevate hingamisteede krooniline haigus, mis on sageli põhjustatud suitsetamisest. Symbicort sisaldab kahte toimeainet: budesoniidi ja formoteroolfumaraatdihüdraati.

- Budesoniid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kortikosteroidideks. Ravim vähendab ja ennetab turset ja põletikku kopsudes.
- Formoteroolfumaraatdihüdraat kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse pikatoimelisteks beeta2-agonistideks ehk bronhilõõgastiteks. Ravim lõõgastab hingamisteede lihaseid. See aitab teil vabamalt hingata.

Symbicort ei sobi kasutamiseks nn hooravimina.

2. Mida on vaja teada enne Symbicorti kasutamist

Ärge kasutage Symbicorti:

- kui olete budesoniidi, formoterooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Symbicorti kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on suhkurtõbi;
- kui teil on kopsuinfektsioon;
- kui teil on kõrge vererõhk või teil on kunagi elus olnud südamevaevusi (sh ebaregulaarne rütm, väga kiire pulss, arterite ahenemine või südamepuudulikkus);
- kui teil on probleeme kilpnäärme või neerupealistega;
- kui teie vere kaaliumisisaldus on väike;
- kui teil on rasked maksaprobleemid.

Teatage oma arstile, kui teil tekib nägemise ähmastumine või teised nägemishäired.

Lapsed ja noorukid

Symbicorti ei soovitata lastele ja alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Symbicort

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eelkõige rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

- beetablokaatorid (nt atenolool või propranolool kõrge vererõhu raviks), sh silmatilgad (nt glaukoomi raviks kasutatav timolool);
- kiire või ebaregulaarse südamerütmi ravimid (nt kinidiin);
- ravimid, nagu digoksiin, mida sageli kasutatakse südamepuudulikkuse raviks;
- diureetikumid, tuntakse ka „vee väljaajamise tablettidena” (nt furosemiid). Neid kasutatakse kõrge vererõhu ravis;
- suukaudsed steroidid (nt prednisoloon);
- ksantiini sisaldavad ravimid (nt teofülliin või aminofülliin), mida sageli kasutatakse KOKi või astma ravis;
- teised bronhilõõgastid (nt salbutamool);
- tritsüklilised antidepressandid (nt amitriptüliin) ja antidepressant nefasodoon;
- fenotiasiinravimid (nt kloorpromasiin ja prokloorperasiin);
- HIV-proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir) HIV-infektsiooni raviks;
- infektsioonide ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool, klaritromütsiin ja telitromütsiin);
- Parkinsoni tõve ravimid (nt levodopa);
- kilpnäärmehaiguse ravimid (nt levotüroksiin).

Kui midagi ülaltoodust kehtib teie kohta või te ei ole selles kindel, pidage enne Symbicorti kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Samuti teavitage oma arsti või apteekrit, kui teil seisab ees üldnarkoos operatsiooni või hambaravi tõttu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

- Kui te olete rase või planeerite rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Ärge kasutage Symbicorti ilma arsti soovituseta.
- Kui te rasestute ajal, mil kasutate Symbicorti, ärge lõpetage ise Symbicorti kasutamist, vaid pöörduge kohe oma arsti poole.
- Kui te toidate last rinnaga, pidage enne Symbicorti kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Symbicort ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise või ja masinate või mehhanismidega töötamise võimet.

3. Kuidas Symbicorti kasutada

- Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Oluline on kasutada Symbicorti iga päev, isegi siis, kui teil ei ole parasjagu KOKi sümptomeid.

Tavaline annus on kaks inhalatsiooni kaks korda ööpäevas. Symbicorti ei soovitata lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.

Kui te olete kasutanud KOKi tõttu hormoon tablette, võib teie arst nende arvu vähendada, kui te alustate ravi Symbicortiga. Kui te olete suukaudseid hormoon tablette kasutanud juba pikka aega, kontrollib teie arst aeg-ajalt teie vereanalüüsi. Kui suukaudsete hormoon tablettide võtmist

vähendatakse, võite te ennast mõnevõrra halvemini tunda, kuigi hingamisega seotud sümptomid leevenevad. Teil võib tekkida nt ninakinnisus või nohu, nõrkus või liiges- või lihasvalu ja nahalööve (ekseem). Võtke kohe oma arstiga ühendust, kui need sümptomid teid häirivad või kui tekib peavalu, väsimus, iiveldus või oksendamine. Kui teil ilmnevad allergia või liigestega seotud sümptomid, võite vajada muud ravi. Rääkige oma arstiga, kui te ei ole kindel, kas jätkata Symbicorti kasutamist.

Teie arst võib teie tavaravile lisada stressiperioodidel (näiteks kui teil on hingamisteede infektsioon või enne operatsiooni) hormoontablette.

Oluline teave KOKi sümptomite kohta

Kui te tunnete, et Symbicorti kasutamise ajal tekib hingeldus või vilistav hingamine, peate jätkama Symbicorti kasutamist, kuid pöörduma nii kiiresti kui võimalik arsti poole, sest võite vajada lisaravi.

Võtke oma arstiga kohe ühendust:

- kui hingeldus süveneb või ärkate sageli öösel hingeldushoo tõttu;
- kui teil tekib hommikuti rinnus pigistav tunne või see tunne kestab kauem kui tavaliselt.
- Need nähud võivad viidata sellele, et KOK ei ole piisavalt kontrolli all ja te võite vajada senisest erinevat või täiendavat ravi.

Arst võib teile määrata KOKi raviks ka teisi bronhe lõõgastavaid ravimeid, nt antikolinergilisi ravimeid (nagu tiotroopium või ipratroopiumbromiid).

Teave Symbicorti kohta

- Enne Symbicorti kasutamist eemaldage see fooliumpakendist. Visake pakend ja selle sees olev kuivatusaine ära. Kui pakendis kaasasoleva kuivatusaine pakikesest on ainet välja tulnud, ei tohi seda inhalaatorit kasutada.
- Kui te olete inhalaatori fooliumpakendist välja võtnud, tuleb inhalaator ära kasutada 3 kuu jooksul. Kirjutage kasutusaeg (3 kuud alates pakendi avamisest) meelestpidamiseks inhalaatori peal olevale sildile.
- Inhalaatori osad on näha joonisel. Kui te inhalaatori saate, on see juba kasutuseks kokku pandud. Ärge võtke seda lahti. Kui kanister hakkab loksuma, pange see inhalaatorisse tagasi ja kasutage inhalaatorit edasi.




Symbicorti ettevalmistamine

Te peate oma inhalaatori kasutamiseks ette valmistama järgmistel juhtudel:

- kui te kasutate uut Symbicorti esimest korda;
- kui te ei ole seda kasutanud rohkem kui 7 päeva jooksul;
- kui see on maha kukkunud.

Inhalaatori ettevalmistamiseks järgige palun allolevat juhendit:

1. Aerosooli kanistris olevate ainete segunemiseks raputage inhalaatorit korralikult vähemalt 5 sekundi jooksul.
2. Huuliku kate eemaldamiseks vajutage õrnalt külgedel olevatele kühmukestele. Huuliku kate jääb kinnitiga inhalaatori külge.
3. Hoidke inhalaatorit püstiasendis. Vajutage ühe annuse saamiseks inhalaatori loendurile (inhalaatori otsa peal). Te võite kasutada ühte või mõlemat kätt, nagu on näidatud pildil.



4. Laske sõrm(ed) loendurilt lahti.
5. Oodake 10 sekundit, raputage inhalaatorit korralikult ning siis korrake samme 3 ja 4.
6. Inhalaator on nüüd kasutamiseks valmis.

Kuidas ravimit inhaleerida?

Iga kord, kui peate ravimit inhaleerima, järgige allolevaid juhiseid:

1. Aerosooli konteineris olevate ainete segunemiseks raputage inhalaatorit korralikult vähemalt 5 sekundi jooksul.
2. Huuliku kate eemaldamiseks vajutage õrnalt külgedel olevatele kümmukestele. Veenduge, et huulik ei ole ummistunud.
3. Hoidke inhalaator püstiasendis (kasutage ühte või mõlemat kätt). Hingake kergelt välja.
4. Asetage huulik õrnalt hammaste vahel. Sulgege huuled.
5. Hingake suu kaudu aeglaselt ja sügavalt sisse. Vajutage ühe annuse manustamiseks inhalaatori loendurile (inhalaatori otsa peal). Jätkake veel lühikest aega sissehingamist, vajutades samal ajal loendurile. Sissehingamine loendurile vajutamise ajal tagab, et ravim jõuab teie kopsudesse.
6. Hoidke hinge kinni 10 sekundi vältel või nii kaua, kuni see ei tekita ebamugavust.
7. Enne väljahingamist laske sõrmed otstelt lahti ja eemaldage huulik suust. Hoidke inhalaator püstises asendis.
8. Siis hingake aeglaselt välja. Järgmise inhalatsiooni tegemiseks raputage inhalaatorit korralikult vähemalt 5 sekundi jooksul ja korrake samme 3 kuni 7.
9. Asetage huuliku kate tagasi.
10. Loputage pärast igapäevast hommikust ja õhtust annust suud veega ning sülitage loputusvesi välja.



Vahemahuti kasutamine

Teie arst, meditsiiniõde või apteeker võivad teil soovitada kasutada vahemahutit (nt *AeroChamber Plus Flow Vu* või *AeroChamber Plus*). Järgige infolehes sisalduvaid juhiseid, mis on vahemahuti pakendiga kaasas.

Symbicorti puhastamine

- Puhastage kuiva riidelapiga huulikut seest ja väljastpoolt vähemalt üks kord nädalas.
- Ärge kasutage vett ega vedelikke ja ärge eemaldage konteinerit inhalaatorist.

Kuidas ma tean, millal tuleb Symbicort välja vahetada?

- Inhalaatori otsal asuvalt loendurilt on näha, mitu annust (inhalatsiooni) on Symbicorti veel jäänud. Loendamine algab alates 120-st, kui see on täis.



- Iga kord, kui inhaleerite või kui lasete annuse õhku, liigub loenduril olev nool nulli (0) poole.
- Kui nool läheneb esmalt kollasele alale, tähendab see, et järel on veel ligikaudu 20 annust.



- Kui nool jõuab 0-ni, siis peate lõpetama Symbicorti kasutamise. Inhalaator ei pruugi näida tühi ja võib tunduda, et see töötab edasi, aga kui te jätkate selle kasutamist, ei saa te õiget hulka ravimit.

Kui te kasutate Symbicorti rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutasite rohkem Symbicorti kui ette nähtud, võtke ühendust oma arsti või apteekriga nõu saamiseks. Kõige tavalisemad tekkida võivad sümptomid on värin, peavalu või kiirenenud südamelöögid.

Kui te unustate Symbicorti kasutada

- Kui te unustate annust inhaleerida, tehke seda niipea, kui see meenub. Kui aga järgmise annuse aeg on peaaegu kätte jõudnud, jätke vahelejäänud annus kasutamata.
- **Ärge** kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Symbicorti kasutamise

Enne kui lõpetate Symbicorti kasutamise, rääkige sellest oma arsti või apteekriga. Symbicorti kasutamise lõpetamisel võivad KOKi haigusnähud ja sümptomid süveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui midagi alljärgnevast juhtub teiega, lõpetage Symbicorti kasutamine ja teavitage sellest kohe arsti:

- näo turse, eriti suu ümbruses (keele ja/või kõri turse ja/või raskused neelamisel) või nõgestõvelaadne lööve koos hingamisraskusega (angioödeem) ja/või äkiline nõrkustunne. See võib tähendada, et teil on tekkinud allergiline reaktsioon. See esineb harva, esinedes vähem kui 1 inimesel 1000-st.
- äkiline vilistav hingamine või õhupuudus kohe pärast ravimi inhaleerimist. Kui teil tekib vähemalt üks nendest sümptomitest, lõpetage kohe Symbicorti kasutamine ja kasutage oma „hooravimit“. Võtke kohe ühendust oma arstiga, sest võib-olla peate oma ravimit vahetama. Neid sümptomeid esineb väga harva, vähem kui 1 inimesel 10 000-st.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

- südamepekslemine (oma südamelöökide tunnetamine), värin või väriseimine. Kui need nähud ilmnevad, on need tavaliselt kerged ja kaovad enamasti Symbicorti kasutamise jätkamisel;
- kandidiaas (seeninfektsioon) suus. Selle tekkimine on väiksema tõenäosusega, kui te loputate oma suud veega pärast Symbicorti kasutamist;
- kerge kurguvalu, köha ja hääle kähedus;
- peavalu;
- kopsupõletik KOKiga patsientidel.

Rääkige oma arstile, kui teil tekib Symbicorti kasutamise ajal mõni järgnevatest sümptomitest; need võivad olla kopsupõletiku sümptomid:

- palavik või külmavärinad;
- suurenenud rögaeritus, röga muutunud värvus;
- suurenenud köha või hingamisraskuse süvenemine.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

- rahutuse, närvilisuse või erutuse tunne;
- unehäired;
- pearinglus;
- iiveldus;
- südame löögisageduse kiirenemine;
- verevalumid nahal;
- lihaskrambid
- nägemise ähmastumine.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

- nahalööve, sügelus;
- bronhospasm (hingamisteede lihaste spasm, mis põhjustab vilistavat hingamist). Kui vilistav hingamine algab äkki pärast Symbicorti kasutamist, lõpetage Symbicorti kasutamine ja teavitage sellest kohe arsti;
- väike kaaliumisisaldus veres;
- ebaregulaarne südamerütm.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

- depressioon;
- käitumishäired, eriti lastel;
- valu või pigistav tunne rinnus (stenokardia);
- vere suhkruisalduse (glükoos) suurenemine;
- maitsetundlikkuse muutused, nt ebameeldiv maitse suus;
- vererõhu muutused.

Inhaleeritavad kortikosteroidid võivad mõjutada tavalist kehaomast steroidhormoonide teket, eriti kui kasutate ravimit suurtes annustes ja pikka aega. Mõju hõlmab järgmist:

- muutused luu mineraalses tiheduses (luude hõrenemine);
- katarakti ehk hallkae (silmaläätse hägusus) teke;
- glaukoomi (tõusnud silmasisene rõhk) teke;
- laste ja noorukite pikkuskasvu aeglustumine;
- mõju neerupealistele (väike nääre neeru vahetus läheduses).

Need nähud avalduvad inhaleeritavate kortikosteroidide korral palju väiksema tõenäosusega, kui kortikosteroidide kasutamisel tablettidena.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Symbicorti säilitada

- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil, fooliumpakendil või inhalaatori sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

- Sarnaselt teiste inhaleeritavate ravimitega väheneb selle ravimi ravitoime, kui konteiner on külm. Seda ravimit tuleb enne kasutamist hoida toatemperatuuril. Mitte hoida külmkapis, mitte lasta külmuda. Kaitsta külmumise ja otsese päikesevalguse eest.
- Kui te olete inhalaatori fooliumpakendist välja võtnud, tuleb see ära kasutada 3 kuu jooksul. Kirjutage kasutusaeg (3 kuud alates pakendi avamisest) meelespidamiseks inhalaatori peal olevale sildile.
- Asetage huuliku kate pärast inhalaatori kasutamist alati peale tagasi.
- Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Hoiatus! Konteiner sisaldab surve all olevat vedelikku. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C. Ärge torgake konteinerit katki. Konteinerit ei tohi purustada, avada ega põletada, isegi kui see näib tühjana.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Symbicort sisaldab

Toimeained on budesoniid ja formoteroolfumaraatdihüdraat. Iga annus (inhalatsioon) sisaldab 160 mikrogrammi budesoniidi ja 4,5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati. Teised koostisosad on apafluraan (HFA 227), povidoon ja makrogool. Inhalaator ei sisalda klorofluorosüsivesinikku (CFC-vaba).

Kuidas Symbicort välja näeb ja pakendi sisu

Symbicort on teile määratud ravimit sisaldav inhalaator. Rõhu all olev konteiner, mis on ühendatud annuse loenduriga, sisaldab valget ravimisuspensiooni. Konteiner on sobitatud punasesse plastikust dosaatorisse, millel on valgest plastikust huulik koos halli plastikust kattega. Iga inhalaator sisaldab 120 annust (inhalatsiooni), kui see on kasutuseks ette valmistatud. Iga inhalaator on eraldi pakitud fooliumist pakkepaberisse, mis sisaldab kuivatusainet.

Symbicort, 160 mikrogrammi/4,5 mikrogrammi, rõhu all olev inhalatsiooniaerosool, suspensioon (budesoniid/formoteroolfumaraatdihüdraat) on saadaval ühte inhalaatorit sisaldavas pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Rootsi

Tootja:

AstraZeneca Dunkerque Production
224 Avenue de la Dordogne
59640 Dunkerque
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AstraZeneca Eesti OÜ
Valukoja 8
11415 Tallinn
Tel: +372 6549 600

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Liikmesriik	Nimi ja tugevus
Austria	Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation Druckgasinhalation, Suspension
Belgia	Symbicort 160 microgram /4,5 microgram/inhalatie, aërosol, suspensie Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension pour

	inhalation en flacon pressurisé Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation, Druckgasinhalation, Suspension
Bulgaaria	Симбикорт 160 микрограма /4,5 микрограма/впръскване Суспензия под налягане за инхалация
Horvaatia	Symbicort 160 mikrograma /4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija
Küpros	Symbicort 160 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό
Tšehhi Vabariik	Symbicort 160 micrograms /4,5 micrograms/inhalation, suspension in pMDI
Taani	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation
Eesti	Symbicort
Soome	Symbicort 160 mikrog /4.5 mikrog/inhalaatio
Prantsusmaa	Symbicort 200/6 microgrammes par inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé
Saksamaa	Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Suspension
Kreeka	Symbicort 160 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό
Ungari	Symbicort 4,5 mikrogramm /160 mikrogramm/ adag túlnyomásos inhalációs szuszpenzió
Island	Symbicort 160 míkrogrömm /4,5 míkrogrömm/ inhalation
Iirimaa	Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation
Itaalia	Symbicort
Läti	Symbicort 160 mikrogrami /4.5 mikrogrami/ inhalācijā, izsmidzinājumā, aerosols inhalācijām zem spiediena
Leedu	Symbicort 160 mikrogramo /4,5 mikrogramo/išpurškime suslėgtoji įkvepiamoji suspensija
Luksemburg	Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé
Malta	Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation
Holland	Symbicort aërosol 200/6, 200 microgram /6 microgram per dosis, aërosol, suspensie
Norra	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/ inhalasjon
Poola	Symbicort
Portugal	Symbicort 160 microgramas /4,5 microgramas/inalação Suspensão pressurizada para inalação
Rumeenia	Symbicort 160 micrograme /4.5 micrograme/inhalație, suspensie de inhalat presurizată
Slovakkia	Symbicort 160 mikrogamov /4,5 mikrogamov/inhalačná dávka, inhalačná suspenzia v tlakovom obale
Sloveenia	Symbicort 160 mikrogramov /4,5 mikrograma na vdih, inhalacijska suspenzija pod tlakom
Hispaania	Symbicort 160 microgramos /4,5 microgramos/inhalación suspensión para inhalación en envase a presión
Rootsi	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation
Ühendkuningriik	Symbicort 200 micrograms/6 micrograms actuation pressurised inhalation, suspension

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2019.