

## Pakendi infoleht: teave kasutajale

### Locaring, 150 mg kõvakapsel flukonasool

#### Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Locaring ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Locaring'i võtmist
3. Kuidas Locaring'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Locaring'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### 1. Mis ravim on Locaring ja milleks seda kasutatakse

Locaring kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse seenevastasteks ravimiteks. Toimeaine on flukonasool.

Locaring'i kasutatakse täiskasvanutel seente poolt põhjustatud nakkuste raviks. Kõige sagedamini seennakkusi põhjustav pärmseen on *Candida*.

Arst võib teile määrata Locaring'i suguelundite kandidiaasi (tupe või peenise infektsioon) raviks.

#### 2. Mida on vaja teada enne Locaring'i võtmist

##### Locaring'i ei tohi võtta

- kui olete flukonasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline või kui olete allergiline teiste ravimite suhtes, mida te olete võtnud seeninfektsiooni või soori raviks. Allergia sümptomiteks võivad olla sügelus, nahapunetus või hingamisraskus;
- kui te võtate astemisooli või terfenadiini (antihistamiinsed ravimid allergia raviks);
- kui te võtate tsisapriidi (kasutatakse seedeprobleemide raviks);
- kui te võtate pimosiidi (kasutatakse vaimsete häirete raviks);
- kui te võtate kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete raviks);
- kui te võtate erütromütsiini (antibiootikum infektsioonide raviks).

##### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Locaring'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- kui te põete maksa- või neeruhaigust;
- kui te põete südamehaigust, sh südame rütmihäired;
- kui teil on veres normist erinev kaaliumi-, kaltsiumi- või magneesiumisisaldus;
- kui teil tekivad rasked nahareaktsioonid (sügelus, nahapunetus või hingamisraskused);
- kui teil on kunagi tekkinud pärast Locaring'i võtmist raske nahalööve või naha koorumine, villid ja/või suuhaavandid.

Locaring'iga ravimisel on teatatud rasketest nahareaktsioonidest, sh eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioonist. Kui märkate lõigus 4 kirjeldatud raskete nahareaktsioonide mis tahes sümptomeid, lõpetage kohe Locaring'i võtmine ja pöörduge arsti poole;

- kui teil tekivad neerupealiste puudulikkuse nähud, mille puhul neerupealised ei tooda piisavas koguses teatud steroidhormoone, nagu kortisool (nähtude hulka kuuluvad krooniline või kauakestev väsimus, lihasnõrkus, söögiisu kadumine, kehakaalu langus, kõhuvalu);
- kui seennakkus ei parane, võib vaja olla kasutada teistsugust seenevastast ravi.

### Lapsed ja noorukid

Kuigi see ravim on ette nähtud täiskasvanutele, võib seda kasutada ka noorukitel (12...17-aastased), kui ravi on hädavajalik ning puuduvad sobivad alternatiivsed võimalused. Ravimi võtmine on sel juhul samasugune nagu täiskasvanute puhul.

### Muud ravimid ja Locaring

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid

Teatage **kohe** oma arstile või apteekrile, kui te võtate astemisooli, terfenadiini (antihistamiinsed ravimid allergia raviks) või tsisapriidi (kasutatakse seedeprobleemide raviks) või pimosiidi (kasutatakse vaimsete häirete raviks) või kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete raviks) või erütromütsiini (antibiootikum infektsioonide raviks), kuna neid ei tohi võtta koos Locaring'iga (vt lõik „Locaring'i ei tohi võtta“).

On olemas mõningad ravimid, millel võib esineda koostoimeid Locaring'iga.

Palun veenduge, et teie arst on teadlik, kui kasutate ükskõik millist järgnevatest ravimitest:

- rifampitsiin või rifabutiin (antibiootikumid infektsioonide raviks);
- alfentaniil, fentanüül (kasutatakse anestesias);
- amitriptüliin, nortriptüliin (kasutatakse antidepressantidena);
- amfoteritsiin B, vorikonasool (seenevastane ravim);
- verd vedeldavad ravimid verehüüvete tekke vältimiseks (varfariin või sarnased ravimid);
- bensodiasepiinid (midasolaam, triasolaam või sarnased ravimid), mida kasutatakse unetuse või ärevuse puhul;
- karbamasepiin, fenütoiin (kasutatakse krampide ravis);
- nifedipiin, isradipiin, amlodipiin, verapamiil, felodipiin ja losartaan (hüpertensiooni e kõrgvererõhutõve raviks);
- olapariib (kasutatakse munasarjavähi ravis);
- tsüklosporiin, everoliimus, siroliimus või takroliimus (siiratud koe või elundi äratõukereaktsiooni ennetamiseks);
- tsüklofosfamiid või vinka-alkaloidid (vinkristiin, vinblastiin või sarnased ravimid), mida kasutatakse kasvujate raviks;
- halofantriin (kasutatakse malaaria raviks);
- statiinid (atorvastatiin, simvastatiin, fluvastatiin või sarnased ravimid), mida kasutatakse kõrge kolesteroolisisalduse alandamiseks;
- metadoon (kasutatakse valu vaigistamiseks);
- tselekoksiib, flurbiprofeen, naprokseen, ibuprofeen, lornoksikaam, meloksikaam, diklofenak (mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d));
- suukaudsed rasestumisvastased preparaadid;
- prednisoon (steroid);
- zidovudiin (tuntud ka kui AZT), sakvinaaviir (kasutatakse HIV-nakkusega patsientidel);
- suhkurtõve puhul kasutatavad ravimid, nagu kloorpropamiid, glibenklamiid, glipisiid või tolbutamiid;
- teofülliin (astma kontrolli all hoidmiseks kasutatav ravim);
- tofatsitiniib (kasutatakse reumatoidartriidi raviks);
- tolvaptaan, mida kasutatakse hüponatreemia (vere madal naatriumisisaldus) ravimiseks või neerufunktsiooni halvenemise aeglustamiseks;
- A-vitamiin (toidulisand);
- ivakaftoor (kasutatakse tsüstilise fibroosi raviks);
- amiodaroon (kasutatakse ebakorrapärase südamelööki – arütmia – raviks);
- hüdroklorotiasiid (diureetikum);

- ibrutiniib (kasutatakse verevähi raviks).

### **Locaring koos toidu ja joogiga**

Te võite seda ravimit võtta koos toiduga või ilma.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda või imetada, ei tohi te Locaring'i võtta, välja arvatud juhul, kui teie arst on seda teile määranud.

Flukonasooli võtmine raseduse esimese trimestri ajal võib suurendada nurisünnituse ohtu.

Esimese trimestri ajal väikestes annuses võetav flukonasool võib veidi suurendada ohtu, et laps sünnib luude ja/või lihaste sünnidefektidega.

Te võite jätkata imetamist pärast ühe 150 mg-se flukonasooli annuse võtmist.

Te ei tohi imetada, kui te võtate korduvaid flukonasooli annuseid.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Locaring võib põhjustada pearinglust või lihastõmbusi. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

### **Locaring sisaldab laktoosi**

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

## **3. Kuidas Locaring'i võtta**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

#### **Täiskasvanud**

150 mg ühekordse annusena.

Neelake kapsel alla tervelt koos klaasitäie veega.

#### **Eakad**

Manustage tavaline täiskasvanute annus.

#### **Neeruhaigusega patsiendid**

Manustage tavaline täiskasvanute annus.

#### **Kui kiiresti ravi mõjuma hakkab?**

##### *Tupe kandidiaas:*

Teie seisund hakkab leevenduma mõne päeva jooksul – mõned naised märkavad paranemist juba ühe päeva pärast. Kui teie seisund ei ole mõne päevaga paranenud, peate sellest rääkima oma arstiga.

##### *Seeninfektsioon peenisel:*

Teie seisund hakkab leevenduma mõne päeva jooksul, kuid paranemiseks võib kuluda ka nädal. Kui teie seisund ei ole ühe nädala pärast paranenud, peate sellest rääkima oma arstiga.

### **Kui te võtate Locaring'i rohkem, kui ette nähtud**

Kui võtate korraga liiga palju kapsleid, siis tekib teil halb enesetunne. Pöörduge kohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võimaliku üleannustamise sümptomiteks võib olla see, kui kuulete, näete, tunnete või mõtlete asjadest, mida tegelikult ei ole olemas (hallutsinatsioonid ja paranoiline käitumine). Võite vajada sümptomaatilist ravi koos toetavate meetmetega ja vajadusel maoloputusega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

### **Kui märkate mis tahes järgmisi sümptomeid, lõpetage kohe Locaring'i võtmine:**

- ulatuslik lööve, kõrge kehatemperatuur ja suurenenud lümfisõlmed (eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon ehk ravimi ülitundlikkussündroom).

Mõnedel inimestel võib tekkida **allergilisi reaktsioone**, kuid tõsiseid allergilisi reaktsioone esineb harva. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest sümptomitest, **rääkige sellest kohe oma arstile.**

- äkki ilmnev vilistav hingamine, hingamisraskus või pigistustunne rinnus;
- silmalaugude, näägu või huulte turse;
- sügelemine üle kogu keha, nahapunetus või sügelevad punased täpid;
- nahalööve;
- rasked nahareaktsioonid, nagu villo põhjustav lööve (see võib tekkida suus ja keelel).

Locaring võib kahjustada teie maksa. Maksaprobleemidele võivad viidata järgmised sümptomid:

- väsimus;
- söögiisu kaotus;
- oksendamine;
- naha või silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus).

Kui teil tekib mis tahes neist nähtudest, lõpetage Locaring'i võtmine, **teatage sellest kohe oma arstile.**

### **Teised kõrvaltoimed:**

Lisaks eelnevale, kui ükskõik milline järgnevatest kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

- peavalu;
- ebamugavustunne maos, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine;
- maksafunktsiooni peegeldavate näitude suurenemine vereanalüüsides;
- nahalööve.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

- vere punaliblede arvu vähenemine, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või hingeldust;
- söögiisu vähenemine;
- unetus, unisus;
- tõmblused, pearinglus, pöörlemise, surina, torkimise või tuimuse tunne, maitsetundlikkuse muutused;
- kõhukinnisus, seedehäired, kõhugaasid, suukuivus;
- lihasvalu;
- maksakahjustus ja naha ning silmade kollaseks muutumine (ikterus);

- kublad, villid (nõgeslõõve), sügelus, suurenenud higistamine;
- väsimus, üldine halb enesetunne, palavik.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

- tavapärasest väiksem vere valgeliblede (aitavad kaitsta organismi nakkuste eest) arv, väiksem vereliistakute (aitavad veritsust peatada) arv;
- naha punakaks või purpurpunaseks värvumine, mida võib põhjustada vereliistakute arvu vähenemine, teised vererakkude muutused;
- vere madal kaaliumisisaldus;
- vere keemiliste näitajate muutused (vere kõrge kolesterooli- ja rasvasisaldus);
- värisemine;
- häired elektrokardiogrammis (EKG), südamelöökide kiiruse või löögisageduse muutused;
- maksapuudulikkus;
- allergilised reaktsioonid (mõnikord rasked), sh laialdaselt leviv villiline lööve ja naha koorumine, raskekujulised nahareaktsioonid, huulte või näopiirkonna turse;
- juuste väljalangemine.

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Locaring'i säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "EXP:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Locaring sisaldab**

- Toimeaine on flukonasool. Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg flukonasooli.
- Teised koostisosad on:  
Kapsli sisu: laktoosmonohüdraat, eelželatiniseeritud maisitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.  
Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E171).

### **Kuidas Locaring välja näeb ja pakendi sisu**

- Suurus „1“, valge kapslikaane ja valge kapslikehaga želatiinist kõvakapsel, mis on täidetud valge pulbriga.
- Locaring on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad ühte kapslit.

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

#### Müügiloa hoidja:

Actavis Group PTC ehf.,  
Reykjavíkurvegur 76-78,  
220 Hafnarfjörður,  
Island

Tootja:  
Specifar SA  
1, 28 Octovriou str.  
Agia Varvara, 12351  
Ateena  
Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Teva Eesti esindus  
UAB Teva Baltics Eesti filiaal  
Hallivanamehe 4  
11317 Tallinn  
Tel: +372 6610801

**Infoleht on viimati uuendatud augustis 2021.**