

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Methotrexate Accord 25 mg/ml süstelahus metotreksaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Methotrexate Accord ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Methotrexate Accord'i kasutamist
3. Kuidas Methotrexate Accord'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Methotrexate Accord'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave.

1. Mis ravim on Methotrexate Accord ja milleks seda kasutatakse

Methotrexate Accord sisaldab toimeainena metotreksaati. Metotreksaat on tsütostaatikum, mis takistab rakkude kasvu. Metotreksaat toimib eelkõige kiiresti paljunevatesse rakkudesse, nagu kasvajakud, luuüdirakud ja naharakud.

Methotrexate Accord'i kasutatakse järgmiste vähivormide raviks:

- äge lümfoidne leukeemia,
- leukeemilise meningiidi profülaktika,
- mitte-Hodgkini lümfoomid,
- osteosarkoom,
- rinnanäärmevähi adjuvantravi ja kaugelearenenud rinnanäärmevähk,
- metastaseerunud või retsiveerunud pea- ja kaelapiirkonna vähk,
- koorionkartsinoom ja teised trofoblasti pahaloomulised kasvajakud,
- kaugelearenenud kusepõie vähk.

2. Mida on vaja teada enne Methotrexate Accord'i kasutamist

Methotrexate Accord'i ei tohi kasutada

- kui olete metotreksaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik);
- kui teil on oluline maksahaigus (arst otsustab haiguse raskusastme üle);
- kui teil on oluline neeruhaigus (arst otsustab haiguse raskusastme üle);
- kui teil on vereloomehäire;
- kui teil on tõsine infektsioon, nt tuberkuloos või HIV;
- kui teil on suu või neelu limaskestast haavandid või mao- ja soolehaavandid;
- kui te imetate last (vt lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus”);
- kui te tarbite suurtes kogustes alkoholi.

Ravi ajal Methotrexate Accord'iga ei tohi teid vaksineerida elusvaksiniidega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Metotreksaat võib põhjustada tõsiseid ja mõnikord eluohtlikke kõrvaltoimeid. Arst selgitab teile ravist saadavat kasu ja võimalikke riske ning kõrvaltoimete varajasi märke ja sümptomeid.

- Ravi ajal Methotrexate Accord'iga võivad teie nahk või silmad muutuda äärmiselt tundlikuks päikese- või muu valguse suhtes. Seetõttu peab vältima päikesevalgust ja solaariumi.
- Metotreksaat võib vähendada immuunsüsteemi rakkude arvu, mis transpordivad hapnikku ja mis vastutavad normaalse verehüübimise eest, mistõttu suureneb võimalus saada infektsioon (nt kopsupõletik) või verejooks.
- Metotreksaadi kasutamisega seoses on reumatoloogilise haigusega patsientidel teatatud ägedast kopsuverejooksust.
- Metotreksaat mõjutab ajutiselt seemnerakkude teket ja munarakkude valmimist. Metotreksaat võib põhjustada raseduse katkemist ja raskeid sünnidefekte. Peate partneriga vältima lapse eostamist metotreksaadi kasutamise ajal ja vähemalt 6 kuu vältel pärast metotreksaadi ravi lõpetamist. Vt ka lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus“.

Enne Methotrexate Accord'i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega

- Kui te saate kiiritusravi samal ajal metotreksaat-raviga. Koe- ja luukahjustuste risk võivad samaaegse ravi korral suurenedada.
- Kui teile manustatakse ravimit seljaajju (intratekaalselt) või veeni (intravenoosselt), võib see põhjustada eluohtlikku põletikku ajus.
- Kui teil on haiguslik vedeliku kogunemine kehapiirkonda, nt kopsudesse või kõhuõõnde.
- Kui teil on neerufunktsiooni häire.
- Kui teil on maksafunktsiooni häire.
- Kui teil on infektsioon.
- Kui teid on vaja vaksineerida. Metotreksaat võib vaktsiinide toimet nõrgendada.
- Kui teil on insuliinsõltuv diabeet, tuleb metotreksaat-ravi hoolikalt jälgida.

Kui märkate või märkab teie partner või hooldaja tekkivaid uusi või süvenevaid neuroloogilisi sümptomeid, sealhulgas üldist lihasnõrkust, nägemishäireid, mõtlemise, mälu ja orienteerumise muutusi, mis põhjustavad segasust ja isiksuse muutusi, pöörduge kohe oma arsti poole, sest need võivad olla väga haruldase raske ajuinfektsiooni, progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML), sümptomid.

Soovitavad järeluuringud ja ettevaatusabinõud:

Isegi väikestes annustes metotreksaadi kasutamisel võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed. Nende õigeaegseks diagnoosimiseks peab arst teid uurima ja määrama laboratoorseid proove.

Enne ravi alustamist:

Enne ravi alustamist võetakse vereproovid ja kontrollitakse, et teie maks ja neerud töötavad korralikult. Teile võidakse teha ka rindkere röntgenuuring. Ravi ajal ja pärast seda võidakse teha täiendavaid analüüse. Ärge jätke kokkulepitud vereanalüüsi vahele.

Muud ravimid ja Methotrexate Accord

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Metotreksaat mõjutab või mõjutavad teatud teised ravimid selle toimet:

- Valu ja põletik (nn mittesteroidsed põletikuvastased ravimid ja salitsülaadid).
- Vähk (tsisplatiin, tsütarabiin, merkaptopuriin).
- Infektsioonid (antibiootikumid, nagu penitsilliinid, tetratsükliin, tsiprofloksatsiin ja klooramfenikool).
- Astma (teofülliin).
- Vitamiinipreparaadid, mis sisaldavad foolhapet või ained nagu foolhape.
- Reuma (leflunomiid).
- Kõrge vererõhk (furosemiid).
- Podagra (probenetsiid).
- Kiiritusravi.
- Maohaavandid, kõrvetised, reflukshaigus (nagu omeprasool, pantoprasool, lansoprasool).
- Epilepsia (fenütoiin).
- Psoriaas või raske akne (retinoidid, näiteks atsitreiin või isotretinoiin).
- Reumatoidartriit või soolehaigus (sulfasalasiin).
- Äratõukereaktsioon pärast elundi siirdamist (asatiopriin).

- Kui teid on vaja vaktsineerida elusvaktsiiniga.

Methotrexate Accord'i kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ravi ajal Methotrexate Accord'iga ei tohi tarbida alkoholi ning peab vältima kohvi, kofeiini sisaldavate karastusjookide ja musta tee joomist suurtes kogustes. Ravi ajal Methotrexate Accord'iga jooge rohkesti vedelikku, sest dehüdratsioon (organismi vedelikuvaegus) võib suurendada Methotrexate Accord'i toksilisust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Ärge kasutage Methotrexate Accord'i raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui arst on selle teile välja kirjutanud vähi raviks. Metotreksaat võib põhjustada sünnidefekte, kahjustada veel sündimata last või põhjustada raseduse katkemist. Seda seostatakse kolju, näopiirkonna, südame ja veresoonte, aju ja jäsemete väärarengutega. Seetõttu on väga tähtis, et metotreksaati ei antaks rasedatele ega naistele, kes kavatsevad rasestuda, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse vähi raviks.

Mitteonkoloogilistel näidustustel tuleb viljakas eas naistel enne ravi alustamist välistada rasedus, näiteks rasedustesti abil.

Ärge kasutage Methotrexate Accord'i, kui te kavatsete rasestuda. Te ei tohi rasestuda ravi ajal metotreksaadiga ja vähemalt 6 kuu vältel pärast ravi lõpetamist. Seetõttu peate kogu selle perioodi vältel kasutama tõhusat rasestumisvastast meetodit (vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kui te ravi ajal siiski rasestute või arvate, et võite olla rase, rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile. Kui te rasestute ravi ajal, räägib arst teiega ravi võimalikest kahjulikest toimetest lapsele.

Kui soovite rasestuda, pidage nõu oma arstiga, kes võib teid enne ravi kavandatavat algust suunata spetsialisti konsultatsioonile.

Mehe viljakus

Olemasolevate tõendite kohaselt ei ole juhul, kui meespartner on kasutanud metotreksaati annuses vähem kui 30 mg nädalas, väärarengute või raseduse katkemise risk suurem. Sellegipoolest ei saa seda riski täielikult välistada ning suuremate metotreksaadi annuste kasutamise kohta andmed puuduvad. Metotreksaadil võib olla genotoksiline toime. See tähendab, et ravim võib põhjustada geenimutatsioone. Metotreksaat võib kahjustada seemnerakkude teket, mis võib põhjustada sünnidefekte.

Metotreksaadiga ravi ajal ja vähemalt 6 kuu vältel pärast ravi lõpetamist peate vältima lapse eostamist või spermadoonoriks olemist. Kuna vähiraviks kasutatakse metotreksaati tavaliselt suuremates annustes ning see võib põhjustada viljatust ja geenimutatsioone, on meespatsientidel, kes kasutavad metotreksaati suuremas annuses kui 30 mg nädalas, soovitatav kaaluda enne ravi alustamist sperma säilitamise võimalusi (vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Imetamine

Metotreksaat eritub rinnapiima sellises koguses, mis mõjutab last. Rinnaga toitmine tuleb seetõttu katkestada enne ravi metotreksaadiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal võib esineda kõrvaltoimeid, nagu väsimus ja pearinglus. Kui tunnete end väsinuna või teil on pearinglus, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Methotrexate Accord sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab 345,59 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes soovitatud maksimaalses ööpäevases annuses. See on võrdne 17,27%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel.

3. Kuidas Methotrexate Accord'i kasutada

Methotrexate Accord'i manustab teile tervishoiutöötaja.

Ravimi annus ja manustamise sagedus sõltub ravitavast haigusest, teie seisundist, vanusest, kehakaalust ja keha pindalast. Methotrexate Accord'i manustatakse lihasesse (intramuskulaarselt), veeni (intravenoosselt), arterisisesele (intraarteriaalselt) või seljaajju (intratekaalselt).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Methotrexate Accord võib põhjustada tõsiseid ja mõnikord eluohtlikke kõrvaltoimeid. Ravi ajal olge tähelepanelik kõrvaltoimete märkide suhtes ja teatage neist oma arstile.

Pöörduge kohe arsti poole, kui teil esineb mõni järgnevatest kõrvaltoimetest. Te võite vajada kohest arstiabi.

- Seletamatu õhupuudus, kuiv köha või vilistav hingamine (kopsuhaiguse sümptomid).
- Äkiline sügelus, nahalööve (nõgestõbi), käte, jalgade, pahklude, näo, huulte, suu või kõri turse (mistõttu on raske hingata ja neelata). Samuti võib tekkida minestustunne (raske allergilise reaktsiooni sümptomid).
- Oksendamine, kõhulahtisus või stomatiit ja maohaavandid (seedetrakti sümptomid).
- Naha või silmade kollasus, tume uriin (maksasümptomid).
- Palavik, külmavärinad, valutav keha ja kurguvalu (infektsiooni sümptomid).
- Ootamatu verejooks (näiteks veritsevad igemed, tume uriin, veri uriinis või okses) või ootamatud verevalumid, must, tõrva meenutav väljaheide – see võib olla tingitud vähenenud hüübimisvõimest või mao- või soolestiku veritsusest).
- Nahalööve koos naha irdumise või villide tekkega ja limaskestade kahjustus, nt ninas (Stevensi-Johnsoni sündroomi, toksilise epidermaalse nekrolüüsi ja multiformse erüteemi sümptomid).
- Ebanormaalne käitumine, mööduv pimedus ja generaliseerunud krambihood (kesknärvisüsteemi sümptomid).
- Halvatus (parees).

Ravi ajal metotreksaadiga esinenud kõrvaltoimed on toodud allpool esinemissageduse järgi.

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

- Isutus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, seedehäired, düspepsia.
- Põletik ja haavandid suus ja neelus.
- Maksaensüümide taseme tõus.

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

- *Herpes zoster.*
- Toime vererakkudele, nt aneemia, leukotsütopeenia, trombotsütopeenia.
- Peavalu, väsimus, uimasus.
- Kuiv köha, õhupuudus, valu rindkeres, palavik.
- Kõhulahtisus.
- Lööbed, punetus ja sügelus.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

- Pantsütopeenia, agranulotsütoos.
- Veresoonte põletik.
- Anafülaktoidsed reaktsioonid ja allergiline vaskuliit.
- Peapööritus, segasus, depressioon.
- Krambid, entsefalopaatia.

- Lümfoom (lümfikoe kasvaja).
- Kopsufibroos.
- Veritsused ja haavandid mao- ja sooletraktis.
- Kõhunäärmpõletik.
- Maksafibroos ja -tsirroos, rasvmaks.
- Diabeetilised komplikatsioonid.
- Albumiini taseme vähenemine.
- Naha muutumine ülitundlikuks päikesevalguse suhtes, nõgestõbi.
- Nahapigmentatsiooni suurenemine.
- Juuste väljalangemine, *herpes zoster*, valulikkus psoriaatiliste kahjustuste (ketendavad laigud nahal) kohal.
- Reumasõlmede arvu suurenemine (koekühmud).
- Naha ja limaskestade kahjustused, mõnikord rasked (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs).
- Kusepõie põletik ja haavandid, veri uriinis, valulik urineerimine.
- Tupepõletik ja –haavandid.
- Luude hõrenemine (osteoporoos), liigesvalu, lihasvalu.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

- Perikardiit, perikardi efusioon ja tamponaad.
- Megaloblastiline aneemia.
- Tujukõikumised.
- Parees.
- Kõnehäired, sealhulgas düsartria ja afaasia.
- Müelopaatia.
- Nägemishäired, hägune nägemine.
- Tromboos (ajus, süvaveenis ja võrkkesta veenis).
- Madal vererõhk.
- Neelupõletik, uneapnoe, bronhiaalastma.
- Igemepõletik.
- Peensoole põletik.
- Veri väljaheites.
- Malabsorptsioon (toitainete imendumishäire soolest).
- Maksakahjustus.
- Akne, haavandid nahal, küünte värvuse muutus, verevalumid.
- Luumurrud.
- Neerupuudulikkus, uriini vähesus, lämmastikku sisaldavate jääkainete suurem sisaldus veres, kuseerituse lakkamine.
- Hüperurikeemia.
- Seerumi kreatiniini sisalduse ja urea sisalduse suurenemine.
- Piimanäärmete ebanormaalne suurenemine.
- Veresuhkru sisalduse tõus (*diabetes mellitus*).

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

- Infektsioonid, sepsis, oportunistlikud infektsioonid.
- Luuüdi raskekujuline kahjustus, aneemia, mis on tingitud asjaolust, et luuüdi ei suuda toota vererakke (aplastiline aneemia), lümfadenopaatia, lümfoproliferatiivne haigus (vere valgeliblede vohamine), eosinofiilia ja neutropeenid.
- Immunosupressioon.
- Hüpagammaglobulineemia.
- Unetus.
- Intellektuaalse võimekuse halvenemine, nagu mõtlemine, meelespidamine ja arutlemine.
- Liiges- ja/või lihasvalu, tugevuse vähenemine.
- Müasteenia (lihasnõrkus).
- Muutused aistingutes, maitsemeele muutused (metallimaitse).
- Meningism (halvatus, oksendamine), äge aseptiline meningiit.
- Silma sidekesta põletik, silma võrkkesta kahjustus, nägemise kaotus, tursed silmade all.

- Silma folliikulite põletik, pisaravool ja valguskartus.
- Tuumorilahustussündroom (tüsisused, mis on tingitud surevate vähirakkude lagunemisest).
- Kopsufunktsiooni häired, õhupuudus, kopsupõletik.
- Kopsu infektsioonid.
- Vedeliku kogunemine kopsu.
- Käärsoolelaiend (toksiline megakoolon).
- Kroonilise hepatiidi taasaktiveerumine, äge maksafunktsiooni vähenemine, *herpes simplex* hepatiit, maksapuudulikkus.
- Küüneümbruse naha valulik paistetus.
- Küünevalli põletik (paronühhia).
- Allergiline vaskuliit, higinäärmpõletik.
- Proteinuuria.
- Sugutungi vähenemine, impotentsus.
- Menstruatsioonihäired.
- Eritis tupest.
- Viljatus.
- Palavik, aeglane haavade paranemine.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- Veritsus, vere väljumine veresoontest.
- Psühhoosid.
- Vedeliku kogunemine ajju ja kopsudesse.
- Metaboolne häire.
- Naha nekroos, eksfoliatiivne dermatiit.
- Lõualuu kahjustused (mis on tekkinud vere valgeliblede vohamise tõttu).
- Nahapunetus ja –ketendus.

Kui teile manustatakse Methotrexate Accord'i seljaajju, võivad tekkida järgmised sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

- Peavalu.
- Palavik.
- Põletik nn aju ämblikvõrkkelmes ja seljaajus, mis võib põhjustada seljavalu, kuklakangestust, oksendamist, palavikku ja üldist halba enesetunnet. See võib toimuda paari tunni jooksul pärast metotreksaadi süstimist, kuid kaob tavaliselt mõne päeva jooksul.
- Hemipleegia või täielik halvatus, nõrkus ühes või kõikides jäsemetes ja krambihood (tekib tavaliselt pärast korduvat metotreksaadi süstimist seljaajju).
- Toime närvisüsteemile, mis võivad väljenduda segasuse, ärrituse ja väsimusena. See süveneb aja jooksul ja arenevad dementsus (süvenev mälukaotus, desorientatsioon ja segasus), kõnehäired, koordineerimise- ja tasakaaluhäired, suurenenud lihasjäikus, krambid ja kooma. Selline seisund võib esineda mitme kuu või aasta järel pärast ravi alustamist metotreksaadi süstidega seljaajju. Seisund võib olla eluohtlik; seda esineb eeskätt patsientidel, kes on saanud metotreksaadi suuri annuseid süstidena seljaajju kombinatsioonis peapiirkonna kiiritusravi ja/või muul viisil manustatud metotreksaadiga.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Methotrexate Accord'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Viaal pärast esmakordset avamist - Kasutage kohe pärast avamist.

Pärast lahjendamist – 24 tundi

Lahjendatud lahuse keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahjendatud lahus kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2...8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Methotrexate Accord sisaldab

- Toimeaine on metotreksaat. 1 ml lahust sisaldab 25 mg metotreksaati.
- Teised koostisosad on naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid/vesinikkloriidhape (pH korrigeerimiseks) ja süstevesi.

Kuidas Methotrexate Accord välja näeb ja pakendi sisu

Ravimpreparaat on selge kollane lahus.

Pakendi suurus:

1 viaal karbis, pakendi suurus: 2 ml, 20 ml ja 40 ml.

10 viaali karbis, pakendi suurus: 20 ml ja 40 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Holland

Tootjad

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.
ul. Lutomińska 50
95-200 Pabianice
Poola

või

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Holland

See ravim on saanud müügiloo Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ja Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaa) järgmiste nimetustega:

Liikmesriigi nimi	Ravimi nimetus
Rootsi	Metotrexat Accord 25 mg/ml injektionsvätska, lösning
Austria	Methotrexat Accord 25 mg/ml Injektionslösung
Belgia	Methotrexate Accord Healthcare 25 mg/ml Oplossing voor injectie/ Solution injectable/ Injektionslösung
Küpros	Methotrexate Accord 25 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα
Tšehhi	Methotrexat Accord 25 mg/ml injekční roztok
Saksamaa	Methotrexat Accord 25 mg/ml Injektionslösung
Taani	Methotrexat Accord
Hispaania	METOTREXATO ACCORD 25 mg/ml solución inyectable
Soome	Methotrexat Accord 25 mg/ml injektioneste, liuos
Prantsusmaa	METHOTREXATE ACCORD 25 mg/ml, solution injectable
Ungari	Methotrexat Accord 25 mg/ml oldatos injekció
Iirimaa	Methotrexate 25 mg/ml solution for injection
Leedu	Methotrexate Accord 25 mg/ml injekcinis tirpalas
Malta	Methotrexate 25 mg/ml solution for injection
Holland	Methotrexat Accord 25 mg/ml, oplossing voor injectie
Norra	Methotrexate Accord 25 mg/ml Injeksjonsvæske, oppløsning
Portugal	Methotrexat Accord
Slovakkia	Methotrexat Accord 25 mg/ml Injekční roztok
Ühendkuningriik	Methotrexate 25 mg/ml solution for injection
Itaalia	Metotrexato Accord
Eesti	Methotrexate Accord
Poola	Metotreksat Accord

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2021.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Methotrexate Accord 25 mg/ml, süstelahuse manustamiskõlblikuks muutmise, käsitlemise ja hävitamise juhend

Enne manustamist kontrollida lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selget ja osakestevaba lahust.

Metotreksaati parenteraalseks manustamiseks võib lahjendada sobiva säilitusainevaba lahusega, nagu glükoosi (5%) või naatriumkloriidi (0,9%) lahusega.

Seoses käsitlemisega tuleb arvestada järgmisi üldisi soovitusi: ravimit võivad käsitleda ainult spetsiaalse koolituse saanud töötajad; lahjendamine võib toimuda ainult selleks ettenähtud spetsiaalses kohas, mille eesmärk on kaitsta töötajaid ja keskkonda (spetsiaalsed toad); kanda kaitseriietust (sh kaitsekindad, kaitseprillid ja vajadusel maskid).

Rasedad tervishoiutöötajad ei tohi Methotrexate Accord'i käsitleda ja/või manustada.

Metotreksaat ei tohi kokku puutuda naha ega limaskestadega. Kokkupuutel tuleb seda kohta otsekohe rohke veega loputada vähemalt kümme minutit.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada. Jäätmematerjal tuleb hävitada ettevaatlikult sobivates eraldi mahutites, mis on selgelt märgistatud vastavalt nende sisule (patsiendi kehavedelikud ja väljaheidet võivad samuti sisaldada arvestatavas koguses kasvajavastaseid aineid, mistõttu neid ja materjale, nagu saastunud voodipesu, tuleb samuti käsitleda kui ohtlikke jäätmel. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele tuhastamise teel.

Juhusliku saastumise kohta, nagu lekkimine, peavad olema kehtestatud asjakohased protseduurid; töötajate kokkupuutumine kasvajavastaste ainetega tuleb registreerida ja seda jälgida.