

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Canephron forte, kaetud tabletid

maasapiürt, hariliku leeskputke juur, rosmariini leht.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Canephron forte ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Canephron forte võtmist
3. Kuidas Canephron forte't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Canephron forte't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Canephron forte ja milleks seda kasutatakse

Canephron forte on traditsiooniline taimne ravim, mida kasutatakse:

- kuseteede põletikuliste haiguste toetavaks ja täiendavaks raviks kergeste kaebuste (nt sage urineerimine, põletustunne urineerimisel ja suurenenud urineerimistung) korral;
- kuseteede läbivoolu parandamiseks ja neerukivide tekke vähendamiseks.

Canephron forte on traditsiooniline taimne ravim, mille näidustused põhinevad pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Kui ravimi kasutamisel haigusnähud püsivad või ilmnevad kõrvaltoimed, mida pakendi infolehes ei ole mainitud, tuleb konsulteerida arsti või kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga.

2. Mida on vaja teada enne Canephron forte võtmist

Canephron forte't ei tohi võtta

- kui olete toimeainete, teiste sarikaliste ehk *Apiaceae* sugukonda (*Umbelliferae* perekonda) kuuluvate taimede (nt aniis, apteegitill), anetooli (eeterlike õlide komponent) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on peptiline haavand;
- kui teil on tursed, mille põhjuseks on südame- või neerufunktsiooni häire ja/või, kui arst on soovitanud vähendada vedelike tarbimist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui tekivad püsiv palavik, alakõhuvalu, krambid, veri uriinis, urineerimishäired ja äge kusepeetus.

Lapsed

Ravimi kasutamiseks alla 12-aastastel lastel puuduvad piisavad andmed. Kuseteede häired lastel vajavad arstiabi (neid peab diagnoosima, ravima ja jälgima arst). Seetõttu ei tohi Canephron forte't kasutada alla 12-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Canephron forte

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada. Kliinilisi koostoime uuringuid ei ole teostatud.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Canephron forte't võib raseduse ajal vajadusel kasutada ainult arsti soovitusel.

Ei ole teada, kas Canephron forte toimeained või selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Canephron forte't ei tohi kasutada imetamise ajal.

Puuduvad andmed mõju kohta inimeste viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Canephron forte toime kohta autojuhtimisele ja masinatega töötamise võimele ei ole uuringuid tehtud.

Canephron forte sisaldab glükoosi, sahharoosi ja laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Teave diabeetikutele:

Ühes kaetud tablettis on keskmiselt 0,3 g kergesti omastatavaid süsivesikuid.

3. Kuidas Canephron forte't võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitav annus on:

Täiskasvanud ja noorukid alates 12 aasta vanusest võtavad 1 kaetud tableti 3 korda ööpäevas.

Lapsed

Canephron forte't ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Maksa-/neerukahjustusega patsientide puhul puuduvad piisavad andmed spetsiaalsete annustamissoovituste kohta.

Manustamisviis

Võtke ühekordne annus (1 tablett) Canephron forte't 3 korda ööpäevas (hommikul, keskpäeval ja õhtul).

Canephron forte tabletid tuleb alla neelata tervelt (närimata) ning soovitatavalt koos vedelikuga, nt klaasi veega.

Ravi ajal tarbida piisavas koguses vedelikku.

Kui sümptomid ei parane või süvenevad 3 päeva jooksul, tuleb konsulteerida arsti või pädeva tervishoiutöötajaga. Seda ravimit ei tohi kasutada kauem kui 2 nädalat ilma arstiga konsulteerimata.

Kui te võtate Canephron forte't rohkem, kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Canephron forte't rohkem, kui ette nähtud, teavitage sellest oma arsti.

Arst määrab vajalikud meetmed. Võimalik, et allpool loetletud kõrvaltoimed esinevad intensiivsemalt.

Üleannustamisest ei ole käesoleva hetkeni teatatud.

Kui te unustate Canephron forte't võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st)
Seedetrakti häired (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
Ülitundlikkusreaktsioonid (lööve, kihelus, näoturse).

Kõrvaltoimete ilmnemisel lõpetage ravimi kasutamine ja konsulteerige viivitamatult arstiga. Arst hindab kõrvaltoime tõsidust ja määrab vajadusel täiendavad meetmed.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Canephron forte't säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Canephron forte sisaldab

Toimeained on:

1 kaetud tablett sisaldab 36 mg maasapi ürdi pulbrit; 36 mg hariliku leeskputke juure pulbrit; 36 mg rosmariini lehe pulbrit.

Teised koostisosad

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat; magneesiumstearaat (taimne); maisitärklis; povidoon K 25; veevaba kolloidne ränidioksiid.

Tableti kate: kaltsiumkarbonaat; looduslik riitsinusõli; raud(III) oksiid (E172); maisitärklis; dekstriin (maisitärklisest); pihustuskuivatatud glükoosisiirup; montaglükoolvaha; povidoon K 30; sahharoos; šellak (vahavaba); talk; riboflaviin (E101); titaandioksiid (E171).

Kuidas Canephron forte välja näeb ja pakendi sisu

Oranžid, ümarad, kaksikkumerad, sileda pinnaga kaetud tabletid, diameetriga 10,2 kuni 10,6 mm.

Pakendis on 30, 60, 90 kaetud tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloo hoidja ja tootja
BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt
Saksamaa
e-post: info@bionorica.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja kohaliku esindaja poole:
AS Oribalt Tallinn
Kõrtsi tee 9
75306 Lehmja, Harjumaa
Eesti
Tel: +372 6515 100

See ravimpreparaat on saanud müügiloo Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria
Bulgaaria, Eesti
Saksamaa, Luksemburg
Ungari
Leedu
Rumeenia
Slovakkia
Sloveenia

Canephron forte Dragees
Canephron forte
Canephron Uno
Canephron forte bevont tablett
Canephron intens dengtos tabletés
Canephron forte drajeuri
Canephron forte obalené tablety
Canephron BNO

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2022.