

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

**Pakendi infoleht: teave kasutajale**

**Atropiin, parenteraalne ravimvorm**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on atropiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne atropiini kasutamist
3. Kuidas atropiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas atropiini säilitada
6. Muu teave

#### **1. Mis ravim on atropiin ja milleks seda kasutatakse**

Toimeaine atropiin on kolinoblokaator. Atropiin pärsib näärmete sekretsiooni, pidurdab seedetrakti peristaltikat ning kõrvaldab uitnärvide pidurdava toime südamele, mille tulemusena südamerütm kiireneb.

Parenteraalselt manustatavat atropiini kasutatakse üldanesteesia eelselt premedikatsiooniks, et vähendada sekretsiooni ja südamelöögisageduse kiirendamiseks bradükardiliste südame rütmihäirete korral.

#### **2. Mida on vaja teada enne atropiini kasutamist**

##### **Ärge kasutage atropiini:**

- kui olete atropiini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes allergiline
- kui teil on suletudnurga glaukoom või anotoomiliselt kitsas silmanurk. Kahtluse korral pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.
- kui teil on paralüütiline iileus
- kui te toidate last rinnaga
- kui teil raskusi urineerimisega

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne atropiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui te olete rase või üritate rasestuda.
- kui teil on palavik.
- kui teil esineb püloruse stenoos e. maolukuti ahenemine, s.o. seisund, mille korral on raskendatud toidu liikumine maost soolde.
- kui teil esineb soolepõletik, mille korral esineb väljaheites verd ja lima.
- kui teil on mingeid probleeme südametöoga, nt suurenenud südame löögisagedus (tahhükardia).

Kui teil esineb mõni ülalmainitud seisunditest, siis rääkige sellest enne atropiini kasutamist kindlasti oma arstiga.

### **Muud ravimid ja atropiin**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui atropiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- Allergiavastased ravimid (antihistamiinikumid)
- Depressioonivastased ravimid (tritsüklilised antidepressandid)
- Ravimid, mida kasutatakse skisofreenia ja teiste psühhiaatriliste haiguste raviks (butürofenoonid ja fenotiasiinid)
- Amantadiin (ravim, mida kasutatakse Parkinsoni tõve puhul)
- Metoklopramiid (iivelduse vastane ravim)

**Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos atropiiniga.** Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Te ei tohi kasutada seda ravimit, kui te toidate last rinnaga.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Atropiin vähendab reaktsioonikiirust ja tähelepanuvõimet, võib mõjutada teie nägemist või ka teie üldist enesetunnet. Kui te ei näe hästi või tunnete ennast halvasti, siis ei tohi te juhtida autot ega töötada masinatega.

## **3. Kuidas atropiini kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **Kui te kasutate atropiini rohkem kui ette nähtud**

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on kasutanud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

### **Kui te unustate atropiini võtta**

Manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

### **Kui te lõpetate atropiini kasutamise**

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Atropiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:

Silma kahjustused:

Pupilli suurenemine, silma siserõhu suurenemine.

Immuunsüsteemi häired:

Nahalööve, ülitundlikkusreaktsioonid.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Nahalööve, nahapunetus, higistamise vähenemine, naha kuivus.

Üldised ja manustamiskoha reaktsioonid:

Palavik

Südame häired:

Pulsisageduse suurenemine, südame pekslemine, ebaregulaarne südametöö.

Neerude ja kuseteede häired:

Urineerimisraskused

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Bronhhide sekretsiooni vähenemine.

Seedetrakti häired:

Iiveldus, oksendamine, suu kuivus, janu, kõhukinnisus.

Psühhiaatrilised häired:

Rahutus, segasus, desorientatsioon, hallutsinatsioonid, deliirium.

Närvisüsteemi häired:

Raskus rääkimisel ja neelamisel, liigutuste koordinatsioonihäire (ataksia).

**Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

**5. Kuidas atropiini säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

**6. Muu teave**

**Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2015.**