

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Progesteron, 25 mg/ml, parenteraalne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on progesteron ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne progesteroni võtmist
3. Kuidas progesteroni võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas progesteroni säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on progesteron ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine progesteron on naise organismis kollaskeha poolt toodetav hormoon. Raseduse ajal suurendab progesteron emaka sisekesta vastuvõtlikkust embrüo pesastumiseks. Kui embrüo on pesastunud, toimib progesteron raseduse säilitamisel. Samuti lõdvestab progesteron emaka silelihast.

Progesteroni kasutatakse infertiilsuse korral kehaväliseks viljastumise soodustamiseks.

2. Mida on vaja teada enne progesteroni võtmist

Ärge kasutage progesteroni:

- kui olete progesteroni või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui teil on ebaselge vaginaalne verejooks
- kui teil on esinenud peetunud rasedust
- kui teil on diagnoositud või kahtlustatav rinnanäärme- või suguteede pahaloomuline kasvaja
- kui äge või anamneesis esinev tromboembooliline häire või tromboflebiit (verehüüvetest põhjustatud pindmiste veenide põletik)
- kui teil on olnud insult või ajuverejooks
- kui teil on raske maksakahjustus

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne progesteroni võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil kahtlustatakse mõnda järgnevatest seisunditest: müokardiinfarkt, tserebrovaskulaarsed häired, arteriaalne või venoosne trombemboolia (sh kopsuemboolia), tromboflebiit või võrkkesta tromboos.
- kui teil on kõrge vererõhk
- kui teil on mõni neeruhaigus
- kui teil on epilepsia

- kui teil on või on varasemalt esinenud depressioon
- kui teil on diabeet
- kui teil on porfüüria
- kui te toidate last rinnaga
- kui te olete valguse suhtes tundlik
- kui teil on migreen
- kui te annate regulaarselt vereanalüüse, et kontrollida oma maksanäitajaid või hormoonide taset (progesteron võib nende analüüside tulemusi mõjutada)

Kui ravi ajal tekib seletamatu ootamatu või järkjärguline, osaline või täielik nägemise kaotus, ähmane nägemine, kahelinägemine, ootamatu lühinägelikkus, misiganes turse silmas või migreen, tuleb ravi katkestada.

Viimasel juhul tuleb alustada asjakohaste diagnostiliste ja ravimeetmetega. Hilisemate tüsistuste ennetamiseks tuleb olla ettevaatlik üle 35-aastaste patsientidega, suitsetajatega ja nendega, kellel esinevad ateroskleroosi riskitegurid.

Enam kui pooled spontaanestest varastest abortidest on tingitud geneetilistest vigadest. Veelgi enam, nakkushaigused ja mehaanilised häired võivad põhjustada varaseid aborte. Seega lükkab progesterooni manustamine edasi surnud munaraku väljutamist (või mitteareneva raseduse katkestamist).

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja progesteron

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui progesterooni kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- bromokrüptiin
- tsüklosporiin

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos progesterooniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et progesteron mõjutaks autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui tunnete ennast peale progesterooni manustamist uimasena.

3. Kuidas progesterooni kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Progesterooni süstelahust turustatakse erinevates klaasampullides (olenevalt tootjast). Küsige apteekrilt, kuidas ampulli õigesti ja ohutult avada.

Kui te kasutate progesterooni rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate progesterooni kasutada

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate progesterooni kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Progesteroon võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Kui ravi ajal tekib mõni järgnevatest nähtudest, siis võtke koheselt ühendust arstiga või pöörduge haiglasse.

- Seletamatu ootamatu või järkjärguline nägemishäire, nt osaline või täielik nägemise kaotus, ähmane nägemine, kahelinägemine, ootamatu lühinägelikkus.
- Turse silmas
- Migreenitüüpi peavalu

Esinemissagedused on määratletud järgmiselt:

väga sage $\geq 1/10$

sage $\geq 1/100$ kuni $< 1/10$

aeg-ajalt $\geq 1/1000$ kuni $< 1/100$

harv $\geq 1/10\ 000$ kuni $< 1/1000$

väga harv $< 1/10\ 000$

teadmata esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Immuunsüsteemi häired

Väga harv: nõgeslööve

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt: vedelikupeetus (tursed)

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu

Aeg-ajalt: unisus, unehäired, pearinglus

Väga harv: depressioon

Seedetrakti häired

Harv: iiveldus

Maksa ja sapiteede häired

Harv: naha- või silmade kollasus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: lööve, akne

Väga harv: naha tumenemine (tavaliselt näol), juuste väljalangemine, liigne karvakasv näol ja kehal

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Sage: menstruatsioonihäired, menstruatsiooni ära jäämine, tsükliväline tupe verejooks

Aeg-ajalt: rindade valulikkus

Väga harv: libiido muutused

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga harv: palavik

Uuringud

Harv: kehakaalu muutused (tõus või langus)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas progesterooni säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015.