

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

**Pakendi infoleht: teave kasutajale**

**Tiamiin, 50 mg/ml, süstitav ravimvorm**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on tiamiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne tiamiini kasutamist
3. Kuidas tiamiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas tiamiini säilitada
6. Muu teave

### **1. Mis ravim on tiamiin ja milleks seda kasutatakse**

Toimeaine tiamiin on vitamiin B1. Tiamiin osaleb organismis toimivas süsivesikute lagundamise protsessis et vabastada neist energiat ning närviimpulsside ülekandes.

Parenteraalselt manustatavat (süstitavat) tiamiini kasutatakse alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete korral ja alkoholi toksilise toime leevendamiseks.

### **2. Mida on vaja teada enne tiamiini kasutamist**

#### **Tiamiini ei tohi kasutada:**

- kui patsient on tiamiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline

#### **Muud ravimid ja tiamiin**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui tiamiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega: Tiamiini antagonistid, nagu nt 5-fluorouratsil, võivad neutraliseerida tiamiini toimet. Seetõttu tuleb nende ravimite kasutamisel samaaegselt kasutada suuremaid tiamiini annuseid.

**Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos tiamiiniga.** Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

#### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Süstitav tiamiin ei ole ette nähtud kasutamiseks raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Ei ole teada, et see ravim mõjutaks auto juhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

### **3. Kuidas tiamiini kasutada**

Tiamiini süstib meditsiinitöötaja.

Tiamiini annustamine sõltub tiamiini defitsiidi raskusest.

Koomas või kiiresti süveneva teadvushäirega alkohoolikule või ägeda mürgistusega patsiendile tuleb manustada i/v 100 mg tiamiini i/v või i/m Wernicke entsefalopaatia tekke/süvenemise ärahoidmiseks (vt KTJ).

### **Kui te kasutate süstitavat tiamiini rohkem kui ette nähtud**

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kuna tiamiini süstib meditsiinitöötaja, siis on üleannistamine vähe tõenäoline. Kui ravimit manustatakse siiski liiga palju, tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tiamiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:

#### Seedetrakti häired:

Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu.

#### Immuunsüsteemi häired:

Allergilised ja anafülaktilised reaktsioonid, mille nähtudeks on sügelemine, lööve, nõgeslööve, angioödeem (lokaalne nahaturse), kõhuvalu, hingamisraskused, südame löögisageduse tõus, südame pekslemine. Harva on teatatud šokist.

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. Kuidas tiamiini säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Muu teave**

### **Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2016.**