

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Teetanuse ja difteeria toksoidide suspensioon (Td vaktsiin), 40RÜ/4RÜ 0,5ml, süstesuspensioon

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Td vaktsiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Td vaktsiini kasutamist
3. Kuidas Td vaktsiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Td vaktsiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on Td vaktsiin ja milleks seda kasutatakse

Td vaktsiin on näidustatud esmaseks immuniseerimiseks teetanuse ja difteeria vastu, alates 7. eluaastast. Teetanuse ja difteeria vastane esmane vaksineerimine, mida alustati pärast 7. eluaastat, viiakse läbi kolm korda sügavalt intramuskulaarselt käe deltalihasesse: kaks esimest annust (0,5 ml) intervalliga vähemalt 30 päeva eraldi annuste vahel. Kolmas annus (0,5 ml) tuleb manustada 6 kuud pärast teist annust.

Revaksineerimine teetanuse ja difteeria vastu üle 7-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Reimmuniseerimise intervallid võiksid olla 10-aastaste vahedega, minimaalne intervalli pikkus on 1 aasta. Td vaktsiini võib kasutada monovalentse teetanuse toksoidi vaktsiini asemel.

Vaksineerimiseks pärast vigastust või teetanuseriskiga põletust, kui on vajalik difteeria vastu vaksineerimine; tehakse 0,5 ml sügavusega intramuskulaarselt käe deltalihasesse.

2. Mida on vaja teada enne Td vaktsiini kasutamist

Td vaktsiini ei tohi kasutada

- kui olete Td vaktsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline, eriti kui teil on tekkinud tõsine allergiline reaktsioon varasema doosi vastu.

Teie arst ütleb teile, kas need seisundid kehtivad teie kohta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Td vaktsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Immuunpuudulikkus

Isikud, kellel on inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), nii asümptomaatiline kui ka sümptomaatiline, tuleks immuniseerida Td vaktsiiniga tavalise annustamisjuhise järgi.

Muud ravimid ja Td vaktsiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Immuniseerimist (vastavalt reimmuniseerimist) Td vaktsiiniga võib läbi viia samaaegselt teiste vaktsiinidega. Td vaktsiin ühildub poliomüeliidi vaktsiiniga, B-hepatiidi vaktsiiniga, leetrite, punetiste, mumpsiviiruse ja kollapalaviku vaktsiiniga. Neid preparaate manustatakse teise steriilse süstla ja nõelaga mujale kui Td vaktsiini süstekohta.

Andmeid koostoimete kohta teiste ravimitega ei ole teatatud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Arsti soovitusel võib raseduse ajal vaksineerida.

Puuduvad andmed vaktsiini kasutamise kohta rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinate käsitlemise võime

Puuduvad tõendid selle kohta, et vaktsiin mõjutaks aktiivset tähelepanu, autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

Oluline teave ravimi koostisainete suhtes

Teile määratud ravimis sisalduvate abianete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.

3. Kuidas Td kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Süstekohas võivad tekkida lokaalsed reaktsioonid, nagu valu, punetus, kerge turse ja pingetunne, mis võivad kaduda 1-2 päevaga. Mõnikord võib esineda kerge temperatuuri tõusu, mis möödub 1-2 päevaga.

Mitmeannuselises viaalis olev ravim sisaldab säilitusainena tiomersaali ja võib põhjustada teil/teie lapsel allergilist reaktsiooni.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Td vaktsiini säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast

lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Täpsemat säilitusjuhendit vaadake pakendilt.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Abiained

Abiained vt pakendilt.

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2022.