

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ciprobay HC kõrvatilgad, suspensioon

tsiprofloksatsiinvesinikkloriid 2,3 mg/ml, hüdrokortisoon 10 mg/ml

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Ciprobay HC ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Ciprobay HC kasutamist
3. Kuidas Ciprobay HC kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Ciprobay HC säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Ciprobay HC ja milleks seda kasutatakse

Ciprobay HC sisaldab kahte toimeainet, tsiprofloksatsiini ja hüdrokortisooni.

Tsiprofloksatsiin on kinoloonide gruppi kuuluv antibakteriaalne aine.

Hüdrokortisoon on glükokortikosteroidide gruppi kuuluv neerupealise hormoon, mis surub alla põletikulaadseid seisundeid.

Ciprobay HC kasutatakse tsiprofloksatsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud väliskõrva ägeda bakteriaalse põletiku raviks.

2. Mida on vaja teada enne Ciprobay HC kasutamist

Ciprobay HC ei tohi kasutada

- kui olete hüdrokortisooni, tsiprofloksatsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui te olete allergiline teiste antibiootikumide suhtes, mida nimetatakse kinoloonideks;
- kui te arvate, et teil on:
 - väliskuulmekäigu viirusinfektsioon;
 - teadaolev või kahtlustatud kuulmekile kahjustus, sh mulgustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Ciprobay HC tohib manustada ainult kõrva(desse).
- Niipea kui märkate esimesi nähtusid, mis viitavad nahalööbele või mõnele muule ülitundlikkusreaktsioonile, sh nõgestõbi, sügelus või hingamisprobleemid, lõpetage ravi ja pöörduge otsekohe oma arsti poole.
- Selle ravimi kasutamisel, eriti pikaajalise ravi korral, võite muutuda vastuvõtlikumaks teistele infektsioonidele.
- Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga.

Muud ravimid ja Ciprobay HC

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ciprobay HC puhul ei ole teada, et see võiks mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

Tilgutiga kork sisaldab latekskummi

Tilgutiga kork sisaldab latekskummi. Võib tekitada raskeid allergilisi reaktsioone.

Ciprobay HC sisaldab bensüülalkoholi

Ravim sisaldab 90 mg bensüülalkoholi 10 ml-s suspensioonis, mis vastab 9 mg/ml. Bensüülalkohol võib põhjustada kerget paikset ärritust.

3. Kuidas Ciprobay HC kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on

3 tilka haigesse kõrva 2 korda päevas. Soovitatud raviage on 7 päeva.

Kui teil on tunne, et Ciprobay HC toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas on õige Ciprobay HC kasutada

1. Eemaldage kork pudelilt ja asetage tilguti pudelile.
2. Loksutage pudelit hästi enne kasutamist.
3. Vältige tilguti saastamist eritisega kõrvast, näppudega või millegi muuga. Suspensiooni tuleb soojendada, hoides seda käes 1-2 minutit.
4. Lamage haige kõrv ülespoole ja tilgutage ravim kõrva.
5. Säilitage see asend vähemalt 30 sekundiks, et tagada tilkade jõudmine kõrva.
6. Kui vajalik, korrake sama protseduuri teise kõrvaga.

Kui tilk läheb kõrvast mööda, proovige veel üks kord.

Kui te kasutate Ciprobay HC rohkem, kui ette nähtud, ärge pange enam kõrva ühtegi tilka, enne kui on aeg manustada järgmine plaanipärane annus.

Kui te unustasite Ciprobay HC kasutada, siis jätkake ravimi manustamist järgmise plaanipärase annusega. Kui on aga juba peaaegu aeg manustada uus annus, siis jätke unustatud annus vahele ja jätkake ravimi manustamist plaanipäraselt. **Ärge** kasutage topeltannust unustatud annuse korvamiseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ciprobay HC kasutamisel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 kasutajal 10-st):

- hüpoesteesia;
- paresteesia.

Sage (võivad esineda 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

- kõrva sügelus.

Aeg-ajalt (võivad esineda 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

- kõrvalu;
- kõrva turse;
- ebamugavustunne kõrvas;
- kuulmekäigu punetus;
- pearinglus;
- peavalu;
- iiveldus;
- nahaketendus;
- naha seeninfektsioon;
- nõgestõbi;
- lööve;
- sügelus;
- ravimi jäägid nahal.

Lisaks on turuletulekujärgsel perioodil teatatud järgmistest kõrvaltoimetest, mille esinemissagedus on teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- kuulmislangus;
- helin kõrvus;
- nägemise ähmastumine.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada

www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Ciprobay HC säilitada

- Säilitada toatemperatuuril.
- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Kõrvatilgad on valgustundlikud ja neid peab hoidma karbis. Ärge hoidke ravimit külmikus.
- Kõrvatilgasid võib kasutada 14 päeva jooksul pärast pudeli esmast avamist. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega.
- Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ciprobay HC sisaldab

- Toimeained on tsiprofloksatsiin ja hüdrokortisoon. 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi (vastab 2 mg tsiprofloksatsiinile) ja 10 mg hüdrokortisooni.
- Teised koostisosad on polüsorbaat 20 (*Polysorbatum 20*), naatriumatsetaat (trihüdraat) (*Natrii acetat (trihydricus)*), jää-äädikhape (*Acidum aceticum glaciale*), bensüülalkohol (*Alcohol benzylicus*) (säilitusaine), letsitiin (*Lecithinum*), naatriumkloriid (*Natrii chloridum*), polüvinüülalkohol (*Alcohol polyvinyllicus*), puhastatud vesi (*Aqua purificata*).

Kuidas Ciprobay HC välja näeb ja pakendi sisu

10 ml valkjat suspensiooni polüpropüleenist keerava korgiga klaaspudelis.

Müügiloa hoidja

SIA Novartis Baltics

Gustava Zemgala gatve 76
LV-1039 Rīga
Läti

Tootjad

Siegfried El Masnou S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou
Barcelona
Hispaania

Novartis Farmacéutica S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes 764
08013 Barcelona
Hispaania

Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Eesti
Telefon: 663 0810

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2021.