

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Antisedan Vet, 5 mg/ml süstelahus**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII  
VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Müügiloa hoidja:  
Orion Corporation  
Orionintie 1  
FI-02200 Espoo  
Soome

Partii väljastamise eest vastutav tootja:  
Orion Corporation Orion Pharma  
Orionintie 1  
FI-02200 Espoo  
Soome

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Antisedan Vet, 5 mg/ml süstelahus

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

**Toimeaine:**

Atipamesoolvesinikkloriid 5 mg/ml

**Abiained:**

Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 1 mg/ml

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Medetomidiini või deksmedetomidiini rahustava ja muude toimete lõpetamine koertel ja kassidel.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Ei ole.

**6. KÕRVALTOIMED**

Kõrvaltoimeid esineb väga harva. Väga harva on täheldatud oksendamist või tugevat süljevoolu, hingeldamist ja roojamist. Vähestel loomadelt on täheldatud kiiresti mööduvat üliärsust ja tahhükardiat.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

**7. LOOMALIIGID**

Koer ja kass.

## 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Manustatakse intramuskulaarselt (i.m.) või subkutaanselt (s.c.). Toime saabub kiiremini pärast intramuskulaarset manustamist. Annust võib vajadusel korrata. Atipamesool manustatakse 15...60 min pärast medetomidiini või deksmedetomidiini manustamist. Loom saavutab normaaloleku 5...10 minuti jooksul.

**Koera** Antisedan Vet'i annus milliliitrites on sama, mis Domitor Vet'i või Dexdomitor 0,5 mg/ml annus. Antisedan Vet'i annus milliliitrites on üks viiendik (1/5) Dexdomitor 0,1 mg/ml annusest. Mikrogrammides arvatuna on Antisedan Vet'i annus võrreldes Domitor Vet'i annusega viiekordne ja Dexdomitor 0,5 mg/ml ning Dexdomitor 0,1 mg/ml annusega võrreldes kümnekordne.

**Kassi** Antisedan Vet'i annus milliliitrites on pool Domitor Vet'i või Dexdomitor 0,5 mg/ml annusest ning üks kümnendik (1/10) Dexdomitor 0,1 mg/ml annusest. Mikrogrammides arvatuna on Antisedan Vet'i annus võrreldes Domitor Vet'i annusega kahe- ja poolekordne ja Dexdomitor 0,5 mg/ml ning Dexdomitor 0,1 mg/ml annusega võrreldes viiekordne.

### Koerad:

Domitor Vet annus	Dexdomitor 0,5 mg/ml annus	Dexdomitor 0,1 mg/ml dannus	Antisedan Vet annus
1000 µg/m <sup>2</sup> 40 µg/kg (KM kohta)	500 µg/m <sup>2</sup> 20 µg/kg (KM kohta)	500 µg/m <sup>2</sup> 20 µg/kg (KM kohta)	5000 µg/m <sup>2</sup> 200 µg/kg (KM kohta)
= 0,4 ml/10 kg	= 0,4 ml/10 kg	= 2,0 ml/10 kg	= 0,4 ml/10 kg

### Kassid:

Domitor Vet annus	Dexdomitor 0,5 mg/ml annus	Dexdomitor 0,1 mg/ml annus	Antisedan Vet annus
80 µg/kg (KM kohta)	40 µg/kg (KM kohta)	40 µg/kg (KM kohta)	200 µg/kg (KM kohta)
= 0,4 ml/5 kg	= 0,4 ml/5 kg	= 1,0 ml/3 kg*	= 0,2 ml/5 kg 0,1 ml/3 kg

\* Kassidele kehakaaluga üle 3 kg soovitatakse kasutada Dexdomitor 0,5 mg/ml.

Antisedan Vet'i võib kasutada äratamisel ka siis, kui loom on uinutatud ketamiini ja Domitor Vet'i või Dexdomitor'i kombinatsiooniga. Annus on sama kui äratamisel pärast Domitor Vet'i või Dexdomitor'i kasutamist ainsa ravimina; siiski ei tohi Antisedan Vet'i manustada enne 30...40 minuti möödumist pärast ketamiini manustamist.

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Vt. lõik 8.

## 10. KEELUAJAD

Ei rakendata.

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamise eritingimused puuduvad.

Pärast karbil („Kõlblik kuni“) ja viaalil („EXP“) märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.

## 12. ERIHOIATUSED

### **Erihoiatused iga loomaliigi kohta**

Pärast Antisedan Vet'i manustamist tuleb loomadel lasta võimalikult vaikselt puhata.

### **Erihoiatused kasutamisel loomadel**

Atipamesooli ei tohi manustada enne 30...40 minuti möödumist juhul, kui loomadele manustati ketamiini koos Domitor Vet'i või Dexdomitor'iga. Kui Domitor Vet'i või Dexdomitor'i toime kõrvaldatakse varem, võib allesjääv ketamiini toime põhjustada krampe.

### **Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud**

Vältida preparaadi kokkupuudet naha või limaskestadega. Kui see siiski juhtub, tuleb nahka või limaskesti koheselt veega loputada.

### **Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil**

Kuna Antisedan Vet'i kasutamist tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole piisavalt uuritud, siis ei soovitata preparaati tiinetel või lakteerivatel loomadel kasutada.

### **Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed**

Mittespetsiifilised tsentraalsed stimulaatorid (nt 4-aminopüridiin) potentseerivad atipamesooli äratavat toimet.

### **Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel**

Üleannustamine põhjustab ülierutuvust ja tahhükardiat. Need nähud on tavaliselt kerged ja mööduvad iseenesest mõne tunni jooksul ning seetõttu pole vastav ravi tavaliselt vajalik.

### **Sobimatus**

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

## 13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsi palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## 14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

August 2018

## 15. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.