

## PAKENDI INFOLEHT

Metabolase

### 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Fatro S.p.A.  
Via Emilia, 285  
40064 Ozzano Emilia (BO)  
Itaalia

### 2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Metabolase

### 3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

#### Toimeained:

1 ml süstelahust sisaldab:

L-karnitiinvesinikkloriidi	6,133 mg mis vastab 5 mg levokarnitiinile
tiokthapet	0,2 mg
püridoksiinvesinikkloriidi	0,15 mg
tsüanokobolamiini	0,03 mg
d,l-atsetüülmetioniini	20 mg
l-arginiini	2,4 mg
l-ornitiinvesinikkloriidi	1,532 mg, mis vastab 1,2 mg l-ornitiinile
l-tsitrulliini	1,2 mg
l-lüsiinvesinikkloriidi	0,625 mg, mis vastab 0,5 mg l-lüsiinile
glütsiini	1,5 mg
tauriini	1,5 mg
aspartaamhapet	1,5 mg
glutamiinhapet	1,5 mg
fruktoosi	50 mg
sorbitooli	80 mg

#### Abiained:

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat  
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat

### 4. NÄIDUSTUS(ED)

Üldtoniseeriv vahend.

### 5. VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole teada.

### 6. KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

### 7. LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas, kits, küülik, koer, kass

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD**

Intravenoosseks, subkutaaneks või intraperitoneaalseks manustamiseks.

Soovituslikud doosid on:

- täiskasvanud veis, hobune ja siga: 250-500 ml intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
- vasikas, varss, täiskasvanud lammas ja kits 250 ml intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
- põrsas ja nuumsiga: 20-40 ml /10 kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
- lambatall ja kitsetall: 20-40 ml/10 kg kehamassi kohta intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt kaks korda päevas;
- küülik ja kass: 2-4 ml/kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
- koer: 2-4 ml/kg kehamassi kohta intravenoosselt või subkutaanselt, kaks korda päevas

Subkutaansel süstimisel jagada doos mitmesse süstekohta.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS**

V.t punkt 8.

## **10. KEELUAJAD**

0 päeva.

Koer, kass: ei rakendata.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

## **12. ERIHOIATUSED**

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

## **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadusandlusele.

## **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

veebruar 2016

## **15. LISAINFO**

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Dimedium  
Emajõe 1a  
51008 Tartu

Eesti Vabariik