

## PAKENDI INFOLEHT

### 1. Veterinaarravimi nimetus

Surolan, nahasuspensioon koertele ja kassidele

### 2. Koostis

#### Toimeained:

1 ml nahasuspensiooni sisaldab:

Mikonasool (mikonasoolnitraadina) 23 mg  
Prednisoloon (prednisoloonatsetaadina) 5 mg  
Polümüksiin B (polümüksiin B sulfaadina) 0,5293 mg

#### Abiained:

<b>Abiainete ja muude koostisosade kvalitatiivne koostis</b>
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Vedel parafiin

### 3. Loomaliigid

Koer, kass.

### 4. Näidustused

Toimeainetele tundlike tekitajate põhjustatud väliskõrva põletike (*otitis externa*) ja naha pindmiste põletike ravi, kui on näidustatud mikonasooli, polümüksiin B ja prednisolooni samaaegne manustamine.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Pärmid ja seened: *Microsporum* spp, *Trichophyton* spp, *Candida* spp, *Malassezia pachydermatis*

Grampositiivsed bakterid: *Staphylococcus* spp (tundlikud tüved), *Streptococcus* spp (tundlikud tüved)

Gramnegatiivsed bakterid: *Pseudomonas* spp (tundlikud tüved), *Escherichia coli*

Kuulmelestad: *Otodectes cynotis*

### 5. Vastunäidustused

Mitte kasutada perforerunud kuulmekilega loomadel, kuna polümüksiin B omab potentsiaalselt ototoksilist toimet.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

### 6. Erihoiatused

#### Erihoiatused

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

### Ettevaatusabinõud ohutuks kasutamiseks loomaliikidel

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ravimi vale kasutamine võib suurendada bakterite resistentsust polümüksiin B suhtes.

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Veterinaarravimiga töötamisel tuleb kasutada kaitsekindaid. Kortikosteroididel võib olla pöördumatu efekt nahale. Imendunud kortikosteroididel võib olla kahjulik toime, eriti sagedase ja ulatusliku kokkupuute korral ja raseduse ajal.

Inimesed, kes on ülitundlikud ükskõik millise ravimi koostisosa suhtes, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

### Tiinus

Glükokortikosteroidide kasutamine tiinuse ajal ei ole soovitatav.

### Kokkusobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

## **7. Kõrvaltoimed**

Koer:

Väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud):	Kurtus <sup>1</sup>
--	---------------------

<sup>1</sup> Peamiselt vanematel koertel.

Paiksete steroidide pikaajaline kasutamine võib põhjustada naha värvikaotust ja viivitust haavade paranemisel.

Võivad esineda tavapärased kortikosteroidide kõrvaltoimed (biokeemiliste parameetrite häirumine, nagu kortisooli ja maksaensüümide taseme tõus).

Kõrvaltoimetest teatamine on oluline. See võimaldab ravimi ohutuse pidevat jälgimist. Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, võtke kõigepealt ühendust oma loomaarstiga. Samuti võite teatada mis tahes kõrvaltoimetest ravimi müügiloo hoidjale, kasutades käesoleva infolehe lõpus esitatud kontaktandmeid või riiklikku teavitussüsteemi [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee)

## **8. Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja -meetod**

Annustamine:

Kõrvad: pärast kuulmekäigu puhastamist manustage kõrva 3 kuni 5 tilka ravimit, kaks korda päevas. Masseerige kõrva ravimi paremaks jaotumiseks.

*Otodectes cynotis* e põhjustatud infektsiooni korral manustage 5 tilka päevas 14 päeva jooksul. Kuulmelestade nakkuse korral tuleb ravida mõlemat kõrva isegi, kui nakkus esineb ainult ühes kõrvas.

Nahk: manustage ravimit kahjustatud alale kaks korda päevas. Kandke ravim kahjustatud nahale kinnastatud käega ja jälgige, et nahakahjustus oleks ravimiga korralikult kaetud.

Pärast mükootilise ja bakteriaalse otiidi kliiniliste tunnuste kadumist tuleb ravi ilma katkestamata jätkata veel mõned päevad. Mõningatel raskesti ravile alluvatel juhtudel võib ravi kesta 2-3 nädalat. Sellest kauem ravi vajavatel juhtudel tuleks ravi ümber hinnata.

## **9. Soovitused õige manustamise osas**

Enne kasutamist põhjalikult loksutada.

Ravi alustamisel ja vajadusel ka ravi vältel tuleks karv nahakahjustustel ja nende ümbert pügada.

## **10. Keeluajad**

Ei rakendata

## **11. Säilitamise eritingimused**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C

## **12. Erinõuded ravimpreparaadi hävitamiseks**

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **13. Veterinaarravimite klassifikatsioon**

Retseptiravim

## **14. Müügiloa number (numbrid) ja pakendi suurused**

1089

Pakendi suurus: 15 ml, 30 ml

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

## **15. Pakendi infolehe viimase läbivaatamise kuupäev**

Veebruar 2023

Üksikasjalik teave selle veterinaarravimi kohta on liidu ravimite andmebaasis.

## **16. Kontaktandmed**

Müügiloa hoidja ning kontaktandmed võimalikest kõrvaltoimetest teatamiseks:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann Str. 4

27472 Cuxhaven

Saksamaa

+ +3728807513

[PV.EST@elancoah.com](mailto:PV.EST@elancoah.com)

Ravimipartii vabastamise eest vastutav tootja:  
Lusomedicamenta, Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.  
Estrada Consiglieri Pedroso, n.o 66, 69-B  
Queluz de Baixo  
2730-055 Barcarena  
Portugal