

## PAKENDI INFOLEHT

**Alamycin, 32,1 mg/g nahasprei, lahus veistele, sigadele ja lammastele**

### **1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Müügiloa hoidja:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited,  
Rossmore Industrial Estate,  
Monaghan,  
Iirimaa

Partii vabastamise eest vastutavad tootjad:

Norbrook Manufacturing Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Iirimaa

Norbrook Laboratories Ltd.  
Station Works  
Newry  
BT35 6JP  
Ühendkuningriik

### **2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Alamycin, 32,1 mg/g nahasprei, lahus veistele, sigadele ja lammastele.  
Oksütetratsükliin

### **3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

**Toimeaine:**

1 g nahasprei, lahust sisaldab:

Oksütetratsükliinvesinikkloriidi 36 mg, mis vastab 32,1 mg oksütetratsükliinile.

**Abiained:**

Patentsinine (E 131), propüleenglükool (säilitusaine, E1520)

### **4. NÄIDUSTUS(ED)**

Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud lokaalsete infektsioonide raviks veistel, sigadel ja lammastel.

### **5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

### **6. KÕRVALTOIMED**

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

## **7. LOOMALIIGID**

Veis, lammas, siga.

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Välispidiseks manustamiseks.

Pihustada mõned sekundid, või kuni kahjustuse ala on piisavalt kaetud.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS**

Sõramädaniku raviks tuleb sõrad eelnevalt puhastada ja värkida. Haavad tuleb enne manustamist puhastada. Rõhukonteinerit tuleb enne kasutamist loksutada.

Ravitud lambad tuleks enne karjamaale tagasi lubamist lasta üks tund kuival pinnal seista.

## **10. KEELUAEG**

Lihale ja söödavatele kudedele: veis, lammas, siga: 0 päeva

Piimale: veis, lammas: 0 päeva.

Mitte kasutada lakteerivate loomade udaral ega nisadel, kui nende piima tarvitatakse inimtoiduks.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ettevaatust konteiner on rõhu all!

Kaitsta rõhukonteinerit otsese päikesevalguse eest ja mitte lasta kuumeneda üle 50°C.

Ka tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

## **12. ERIHOIATUSED**

### **Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel**

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.

### **Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil**

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

### **Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule**

Inimesed, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes, peaksid preparaadiga töötamist vältima.

Vältida preparaadi sattumist silma. Vältida preparaadi kontakti nahaga.

Vältida ravimi sissehingamist.

Pärast kasutamist pesta käed.

Preparaadi käsitlemise ajal mitte suitsetada.

Kergesti süttiv. Mitte pihustada lahtise tule või hõõguvate materjalide läheduses.

Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides.

Konteiner on rõhu all. Mitte lõhkuda ega põletada konteinerit pärast kasutamist.

### **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

August 2019

### **15. LISAINFO**

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

76401 Laagri

Harjumaa

Eesti

Tel. +372 6 501 920