

PAKENDI INFOLEHT

Calci-kel, 279,24 mg/ml + 40 mg/ml süstelahus veistele ja lammastele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

KELA N.V.
St. Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
Belgia.

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Calci-kel, 279,24 mg/ml + 40 mg/ml süstelahus veistele ja lammastele
Kaltsiumglükonaat/Magneesiumkloriid

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 ml süstelahust sisaldab:

Kaltsiumglükonaati	279,24 mg (vastab Ca ²⁺ : 24,96 mg)
Magneesiumkloriidi	40 mg (vastab Mg ²⁺ : 4,78 mg)

Abiained: boorhape, metüülparahüdrokübensoaat, süstevesi.

Selge, peaaegu värvitu lahus.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Äge hüpokaltseemia veistel ja lammastel.

Äge hüpomagneseemia veistel.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada südame-veresoonkonna puudulikkuse puhul.

6. KÕRVALTOIMED

Liiga kiire veenisisene manustamine võib esile kutsuda äkilist tahhükardiat, südame rütmihäireid ja südame seiskumist ning selle tagajärjel põhjustada surma.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7. LOOMALIIGID

Veis, lammas.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Aeglaseks veenisiseseks manustamiseks.

Annustamine: 1ml kg/kehamassi kohta.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Aeglaseks veenisiseseks manustamiseks.

Manustada aseptika nõudeid järgides. Enne intravenoosset manustamist tuleb lahus soojendada kehatemperatuurini ning seejärel süstida väga aeglaselt.

10. KEELUAEG

0 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

12. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Veenisese manustamise ajal on soovitatav pidevalt kontrollida südame tööd. Südame rütmihäirete või südame töö äkilise kiirenemise korral tuleb koheselt lõpetada ravimi manustamine ning edasine ravi tuleb teostada järkjärgult südame tööd pidevalt jälgides.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suurenenud kaltsiumi kontsentratsioon võib tõsta südameglükosiidide, sümpatomimeetikumide ja metüülksantiinide (nt kofeiin) terapeutilist, kuid ka toksilist toimet. Kaltsium antagoniseerib aminoglükosiidantibootikumide põhjustatud neuromuskulaarse blokaadi ning moodustab lahustumatuid komplekse tetratsükliinidega.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Liiga kiire veenisese manustamine ja/või üleannustamine võib suurendada hüperkaltseemia tunnuseid. Bradükardiale järgneb äkiline tahhükardia, südame rütmihäired, südame seiskumine ja surm.

Teised võimalikud tunnused on lihasvärinad, rahutus ja higistamine. Nende tunnuste ilmnemisel tuleb ravi koheselt katkestada ja rakendada sümptomaatilist ravi, manustada intravenoosselt Na-EDTA-d.

Sobimatus

Kaltsiumisoolasid ei sobi manustada samaaegselt koos oksüdeerivate ainetega, tsitraatidega, lahustuvate karbonaatidega, bikarbonaatidega, fosfaatidega, tartraatidega ja sulfaatidega. Füüsikalist

sobimatust võib esineda koos amfoteritsiiniga, naatriumtsfalotiiniga, naatriumtsfasoliiniga, naatriumnovobiotsiiniga ja tetratsükliinidega. Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

November 2014

15. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
76401 Laagri
Harjumaa
Tel. +372 6 501 920