

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Vitamin E + Selen vet, süstelahus veistele, sigadele ja lammastele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

V.M.D. n.v.

Industrieterrein Hoge Mauw 900

2370 Arendonk

Belgia

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Vitamin E + Selen vet, süstelahus veistele, sigadele ja lammastele

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

1 ml süstelahust sisaldab:

**Toimeaine:**

Vitamiin E ( $\alpha$ -tokoferoolatsetaat) 100 mg

Seleen (veevaba naatriumseleniidina) 0,6 mg

**Abiained:**

Bensüülalkohol, naatriumlaurüülsulfaat, naatriummetüülparahüdroksübensoaat, makrogoolglütseroolriitsinolaat, dietüleenglükoolmonoetüüleeter, süstevesi.

**4. NÄIDUSTUSED**

Vitamiin E ja seleeni vaeguse vältimine.

Müopaatia-düspnoe sündroom vasikatel (valgelihastõbi), lihaste degeneratsioon sigadel ja lammastel.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Soovitatud annuste manustamisel ei ole teada.

**6. KÕRVALTOIMED**

Soovitatud annuste manustamisel ei esine paikseid ega üldisi reaktsioone.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

**7. LOOMALIIGID**

Veis (vasikas), siga, lammas.

**8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Müopaatia profülaktika: 1 ml süstelahust 10 kg kehamassi kohta. Vajadusel võib manustamist korrata 15 päeva pärast annusega 0,5 ml süstelahust 10 kg kehamassi kohta.

Vaegusseisundite ravi: 1 ml süstelahust 5 kg kehamassi kohta. Vajadusel võib manustamist korrata 15 päeva pärast annusega 0,5 ml süstelahust 5 kg kehamassi kohta.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS**

Lihasesiseseks manustamiseks.

Kasutada steriilseid materjale ja enne süstimist desinfitseerida süstimiskoht.

Mitte manustada rohkem kui 15 ml süstelahust ühte süstekohta.

## **10. KEELUAEG**

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 päeva.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva.

## **12. ERIHOIATUSED**

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida juhuslikku enesele süstimist. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Üleannustamine

Üleannustamise korral on esimesed nähud tingitud seleenimürgistusest ja need on seotud kesknärvisüsteemiga (pimedaksjäämine, vestibulaarhäired). Apnoe esineb hilisemas staadiumis. Nende nähtude ilmnemisel alustada kohe sümptomaatilise raviga.

Tiinus, laktatsioon

Kliinilised uuringud ravimi kasutamise kohta tiinetel loomadel puuduvad, seetõttu tuleb antud veterinaarravimit tiinuse ajal kasutada vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

## **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

## **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Aprill 2020

## **15. LISAINFO**

Pakend: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml või 12 x 100 ml..

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Zoovetvaru  
Uusaru 5  
Saue 76505  
Tel: 800 9000