

## **B. PAKENDI INFOLEHT**

## PAKENDI INFOLEHT

Aurizon, kõrvatilgad, suspensioon koertele

### 1. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS JA PARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Müügiloa hoidja ja tootja:

Vetoquinol SA  
Magny-Vernois  
B.P. 189, 70204  
Lure Cedex  
Prantsusmaa

### 2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Aurizon, kõrvatilgad, suspensioon koertele.

### 3. TOIMEAINED JA MUUD ABIAINED

#### Toimeained:

1ml suspensiooni sisaldab:

Marbofloksatsiini	3 mg
Klotrimasooli	10 mg
Deksametasoonatsetaati	1,0 mg
(mis vastab 0,9 mg deksametasoonile)	

#### Abiained:

Propüülgallaat (E310), sorbitaanoleaat, kolloidne veetustatud ränidioksiid, keskmise pikkusega ahelatega triglütseriidid.

### 4. NÄIDUSTUSED

Marbofloksatsiinile tundlike bakterite ja klotrimasoolile tundlike seente, eriti *Malassezia pachydermatis* e põhjustatud väliskõrvapõletike ravi.

Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumid tundlikkuse uuringutel.

### 5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada koertel, kellel esineb trummikile perforatsioon.

Mitte kasutada koertel, kes on teadaolevalt ülitundlikud ravimi mõne koostisosa suhtes.

Mitte kasutada tiinetel ega imetavatel koertel.

### 6. KÕRVALTOIMED

Võivad esineda tavalised kortikosteroidraviga seotud kõrvaltoimed (muutused biokeemilistes ja hematoloogilistes parameetrites, nagu aluselise fosfataasi ja aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine, vähene neutrofiilia).

On teada, et pikaajaline ja intensiivne paiksete kortikosteroidpreparaatide manustamine võib põhjustada lokaalseid ja süsteemseid toimeid, kaasa arvatud neerupealiste funktsiooni pärssumine epidermise õhenemine ja haavade paranemise aeglustumine.

Harvadel juhtudel võib selle preparaadi kasutamist seostada kurtusega, mis esineb peamiselt vanematel koertel ja on tavaliselt mööduva iseloomuga.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

## **7. LOOMALIIGID**

Koer.

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE JA –MEETOD**

Enne kasutamist preparaati loksutada.

Manustada kõrva kümme tilka üks kord päevas 7...14 päeva jooksul. Pärast seitsmepäevast ravi peab veterinaararst hindama ravi pikendamise vajadust veel ühe nädala võrra.

Üks tilk ravimit sisaldab 71 µg marbofloksatsiini, 237 µg klotrimasooli ja 23,7 µg deksametasoonatsetaati.

Pärast manustamist võib kõrva alaosa lühidalt ja õrnalt masseerida, et ravim saaks tungida välimise kuulmekäigu alumisse ossa.

Kui preparaati kasutatakse mitmel koeral, kasutada igal koeral erinevat kanüüli.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS**

V.t. punk 8.

## **10. KEELUAJAD**

Ei rakendata.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte hoida temperatuuril üle 30°C.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaaja lõppu mitte kasutada.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 2 kuud.

## **12. ERIHOIATUSED**

Pärast ravimi manustamist pesta käed hoolikalt.

Vältida kontakti silmadega. Silma sattumisel loputada rohke veega.

Inimesed, kes on ülitundlikud preparaadi koostisosade suhtes, peaksid vältima kontakti veterinaarpreparaadiga.

Pidev ühe antibiootikumiklassi kasutamine võib muuta bakterite populatsiooni resistentseks. Fluorokinoloonid tuleb jätta selliste kliiniliste seisundite raviks, mis on allunud või mis eeldatavalt alluvad halvasti ravile muude antibiootikumidega.

Enne ravimi kasutamist tuleb kontrollida kuulmekile seisundit.

Enne ravimi manustamist tuleb välimine kuulmekäik põhjalikult puhastada ja kuivatada.

**13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata.  
Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

**14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Aprill, 2012

**15. LISAINFO**

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ Zoovetvaru  
Uusaru 5  
Saue 76505  
Telefon: 800 9000