

## PAKENDI INFOLEHT

Bovaclox DC, intramammaarsuspensioon veistele.

### 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

#### Müügiloa hoidja:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Iirimaa

#### Partii vabastamise eest vastutavad tootjad:

Norbrook Manufacturing Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Iirimaa

Norbrook Laboratories Limited  
Station Works  
Newry  
BT35 6JP  
Ühendkuningriik

### 2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bovaclox DC, intramammaarsuspensioon veistele.

### 3. TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

1 udarasüstal (4,5 g intramammaarsuspensiooni) sisaldab:

#### **Toimeained:**

kloksatsilliini (bensatiinkloksatsilliinina) 500 mg  
ampitsilliini (ampitsilliintriühüdraadina) 250 mg

**Abiaine(d):** alumiiniumstearaat, vedel parafiin.

### 4. NÄIDUSTUS(ED)

Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile ning nende kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud udara infektsioonide ravi ja profülaktika kinnisperioodil.

### 5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.  
Mitte kasutada, kui poegimiseni on jäänud vähem kui 45 päeva.  
Mitte kasutada väga lühikese kinnisperioodiga lehmadel.  
Teadaolev ülitundlikkus preparaadi koostisosade suhtes.

### 6. KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.  
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

### 7. LOOMALIIGID

Veis (kinnislehmad).

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD**

Intramammaarseks manustamiseks.

Ravi kinnisperioodil: pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi puhastada ning desinfitseerida nidad.  
Manustada nisajuha kaudu igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu.

Ravi suvemastiidi korral: suveperioodil, kui esineb risk suvemastiiti haigestumiseks, on soovitatav kõikidele lehmadele lisaks tavapärasele kinnisperioodi ravile manustada 3 nädalase intervalliga igasse udaraveerandisse veel ühe süstla sisu. Enne ravimi manustamist puhastada ning desinfitseerida nidad ning manustada nisajuha kaudu igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS**

V. t. punkt 8 Annustamine loomaliigiti, manustamistee(d) ja –meetod.

## **10. KEELUAJAD**

Piimale: 96 tundi pärast poegimist. Kui lehm poegib varem kui 45 päeva pärast viimast ravimi manustamist, tohib piima inimitoiduks kasutada alles 45 päeva ja 96 tunni möödumisel viimasest ravimi manustamisest.

Lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Süstal on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Osaliselt kasutatud süstal hävitada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

## **12. ERIHOIATUSED**

### **Erihoiatused iga loomaliigi kohta**

Vältida süstla otsiku saastumist pärast katte eemaldamist.

### **Ettevaatusabonõud kasutamisel loomadel**

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.

### **Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule**

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhalatsiooni, alla neelamise või nahakontakti järgselt põhjustada ülitundlikkust (allergiat).

Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib anda ristuva reaktsiooni tsefalosporiinidega ja vastupidi.

Allergilised reaktsioonid antud ainetele võivad mõnikord osutuda tõsisteks.

1. Ärge käsitage seda ravimit, kui teate, et olete ülitundlik, või kui teil on soovitatud selliste preparaatidega mitte töötada.
2. Rakendage kõiki soovitatud ettevaatusabinõusid. Olge ravimi käsitlemisel ettevaatlik, et vältida naha juhuslikku kokkupuutumist ravimiga. Soovitatav on kasutada ravimi käsitlemisel või manustamisel kindaid. Pärast kasutamist peske ravimiga kokkupuutunud nahapiirkonda.
3. Kui teil tekivad pärast ravimiga kokkupuutumist sümptomid, näiteks nahalööve, pöörduge arsti poole ja näidake talle seda hoiatust. Näo, huulte või silmade turse või hingamisraskused on tõsisemad sümptomid ja vajavad kiiresti arstiabi.

**Tiinus:** Preparaat sobib kasutamiseks tiinetel loomadel.

**Laktatsioon:** Preparaat ei ole mõeldud kasutamiseks lakteerivatel lehmadel.

### **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

August 2019

### **15. LISAINFO**

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügihoa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

Laagri

Harjumaa 76401

Tel. 06501999

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.