

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Septolete Lemon 1,2 mg losengid

Tsetüülpüridiinkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne ennast paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Septolete Lemon ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Septolete Lemon'i võtmist
3. Kuidas Septolete Lemon'it võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Septolete Lemon'it säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Septolete Lemon ja milleks seda kasutatakse

Septolete Lemon'i losengid (imemistabletid) avaldavad paikset mikroobivastast toimet. Need sisaldavad antiseptilist tsetüülpüridiinkloriidi, mis lagundab baktereid ja seeni ning mõningal määral pärsib see ka viiruste arenemist. Imemistabletid desinfitseerivad suuõõnt ja kurku, leevendades seeläbi suuõõne- ja kurgupõletikku.

Septolete Lemon on näidustatud suuõõne ja neelu antiseptikaks bakterite ja seente poolt põhjustatud infektsioonide korral.

Tänu oma heale märgumisvõimele ja väikesele pindpinevusele tungib tsetüülpüridiinkloriid ka suu ja neelu limaskestade raskesti ligipääsetavatesse osadesse ning pärsib bakterite kasvu.

Septolete Lemon'i imemistablettidel on meeldiv ja värskendav sidruni maitse.

Nad ei sisalda sahharoosi, mida bakterid kasvuks vajavad, seetõttu ei põhjusta nad hammaste lagunemist; antiseptikumi toime on palju parem suhkruvabas aluses.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne ennast paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Septolete Lemon'i võtmist

Ärge kasutage Septolete Lemon'it:

- kui olete tsetüülpüridiinkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- kui teil on suus lahtised haavad (näiteks peale hamba väljatõmbamist, kurgumandlite kirurgilist eemaldamist jne.), sest tsetüülpüridiinkloriid võib aeglustada haavade paranemist;
- kui teil on tõsine nakkus, millega kaasneb kõrge palavik, peavalu ja oksendamine; võtke ühendust oma arstiga, eriti kui teie seisund ei parane 3 päeva jooksul;

- kui teil on suhkurtõbi, peate te meeles pidama, et iga imemistablett sisaldab umbes 1 g maltitooli. Aeglase hüdroliüsumise ja imendumise tõttu seedetraktis on maltitoolil mõningane toime veresuhkru tasemele.

Ei soovitata kasutada suuremaid annuseid, kui on välja kirjutatud.

Lapsed ja noorukid

Imemistabletid ei soovitata alla 4-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Septolete Lemon

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ei ole täheldatud, et Septolete Lemon'i imemistabletid avaldaksid mõju teistele ravimitele.

Septolete Lemon koos toidu ja joogiga

Ärge võtke imemistablette koos piimaga, sest piim vähendab Septolete Lemon'i efektiivsust. Ärge võtke Septolete Lemon'it vahetult enne sööki või söögi ajal. Pärast ravimi võtmist ärge sööge ega jooge vähemalt üks tund.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna ravimi ohutu kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal on andmed piiratud, ei soovitata seda raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Septolete Lemon losengide mõjust autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele teateid ei ole.

Septolete Lemon sisaldab abiaineid

Imemistabletid sisaldavad looduslikku värvainet, seetõttu võib nende värv aja jooksul pleekida, kui neid hoitakse valgusküllases kohas.

Septolete Lemon sisaldab maltitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

3. Kuidas Septolete Lemon'it võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Iga 2...3 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 8 imemistabletti päevas.

10...12-aastased lapsed

Iga 3...4 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 6 imemistabletti päevas.

4...10-aastased lapsed

Iga 3...4 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 4 imemistabletti päevas.

Ärge võtke imemistablette vahetult enne sööki või söögi ajal. Pärast ravimi võtmist ärge sööge ega jooge vähemalt üks tund.

Kui teil on tunne, et Septolete Lemon'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Septolete Lemon'it rohkem kui ette nähtud

Arvestades toimeainete kogust igas imemistabletis on üleannustamise võimalus minimaalne. Suure arvu imemistablettide allaneelamine võib põhjustada seedetraktihäireid, iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust. Sellisel juhul lõpetage ravimi kasutamine, jooge palju vett või piima ja pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Septolete Lemon'it võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

- seedetraktihäired, eriti tundlikel inimestel ja ettenähtust suuremate annuste kasutamisel.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):

- ülitundlikkusreaktsioonid nagu ärritus ja lööve.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Septolete Lemon'it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Septolete Lemon sisaldab

- Toimeaine on tsetüülpüridiinkloriid. Üks loseng (imemistablett) sisaldab 1,2 mg tsetüülpüridiinkloriidi.
- Teised koostisosad on: vedel maltitool, maltitool (E965), mannitool (E421), levomentool, sidruniõli, glütserool (E422), riitsinusõli, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat (E572), povidoon, farmatseutilised vahad (mesilasvaha (E901), karnaubavaha (E903), šellak (E904)), titaandioksiid (E171), laimi maitseaine, sidruni maitseaine, apelsiniõli maitseaine, kollane värvaine (kurkumiin (E100), vesi, kummiaraabik (E414), maltodekstriin, sidrunhape (E330), rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappeestrid (E472c), naatriumbensoaat (E211) ja kaaliumsorbaat (E202)).

Kuidas Septolete Lemon välja näeb ja pakendi sisu

Imemistabletid on kollast värvi, ümmargused ja kergelt kaksikkumerad.

Imemistabletid on saadaval 18 kaupa karpides. Karbid sisaldavad 2 mullpakendit, kummaski 9 imemistabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2016.