

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Linola Urea, 120 mg/g kreem

uurea

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Linola Urea ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Linola Urea kasutamist
3. Kuidas Linola Urea` t kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Linola Urea` t säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Linola Urea ja milleks seda kasutatakse

Linola Urea kreemi kasutatakse kuiva hüperkeratoosse ja/või ketendava naha raviks. Toimeaine uurea kasulik mõju seisneb tema võimes epidermise sarvkihis vett siduda. Vesi tagab naha sileduse ja elastsuse.

Peale veesidumisvõime on uureal ka väga head keratolüütilised omadused, mis omavad tähtsust ihtüoosi ravis. Uureal on ka kihelust vähendav ja kerge antiseptiline toime. Kõrges kontsentratsioonis on uureal proteolüütilised omadused, mida kasutatakse soolatüügaste ravis ja jala seenhaiguse poolt kahjustatud küünte lahustamisel.

2. Mida on vaja teada enne Linola Urea kasutamist

Linola Urea` t ei tohi kasutada

- kui olete uurea või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kriimustatud naha ja ägeda dermatiidi korral
- suurtel nahapiirkondadel, kui esineb probleeme neerude töös

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Linola Urea` t kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Informeerige oma arsti enne ravimi kasutamist kõigist teistest haigustest, mis teil esinevad. Vältige kreemi sattumist silma ja limaskestadele.

Lapsed

Ärge kasutage Linola Urea` t vastsündinutel ja alla 1-aastastel lastel, kuna puuduvad sellekohased kliinilised kogemused.

Muud ravimid ja Linola Urea

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid. Teiste välispidiselt kasutatavate ravimite vabanemine või imendumine nahka võib Linola Urea toimel suurenedada. Nimetatud nähtus on tõestatud kortikosteroidide, ditanooli ja 5-fluorouratsiili kasutamisel. Palun pöörake tähelepanu ka asjaolule, et suurenedada võib ka hiljuti kasutatud ravimite imendumine.

Rasedus ja imetamine

Linola Urea` t võib kasutada raseduse ja imetamise ajal, kuna tänaseni ei ole kahjulikke mõjusid täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Linola Urea kreem ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Linola Urea sisaldab propüleenglükooli ja tsetüülalkoholi

See ravim sisaldab 88 mg propüleenglükooli ühes grammis kreemis. Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.

Tsetüülalkohol võib põhjustada lokaalset nahaärritust (nt kontaktdermatiiti).

3. Kuidas Linola Urea` t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui ei ole määratud teisiti, kantakse Linola Urea` t 2 korda päevas õhukese kihina haigestunud nahapiirkonnale ja hõõrutakse kergelt sisse. Ravi kestus sõltub haiguse iseloomust.

Kui teil on tunne, et Linola Urea toime on liiga tugev või nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Linola Urea` t rohkem, kui ette nähtud

Juhul, kui Linola Urea` t määratakse nahale liiga suures koguses või liiga tihti, võib esineda suurenenud nahaärritus. Sellisel juhul tuleb pärast ärrituse kadumist kasutatava ravimi kogust ja määrimissagedust kohaldada vastavalt patsiendi naha seisundile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Peamised Linola Urea kasutamisega kaasnevad kõrvalmõjud on naha kipitus, õhetus, sügelus ja punetus, mis enamasti kaovad ravi lõpetamisel. Juhul, kui esineb ülitundlikkus mõne ainega, eriti propüleenglükooli ja fenoksüetanooli suhtes, tuleks ravi Linola Urea` ga katkestada.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Linola Urea`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Linola Urea sisaldab

- Toimeaine on uurea.
- Teised koostisosad on fenoksüetanol, dimetikoon 350, tsetüülalkohol, piimhape, naatriumlaktaat, propüleenglükool, polü(oksüetüleen)-20-glütserüülmonostearaat, glütserüülmonostearaat, triglütseriidid, parafiin ja vesi.

Kuidas Linola Urea välja näeb ja pakendi sisu

Pakendi suurus: ühes tuubis on 75 g, 50 g, 150 g või 500 g kreemi

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld, SAKSAMAA

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis

AS Sirowa Tallinn

Salve 2C

11612 Tallinn

Tel: 6830 7040

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2020.