

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bronchipret, suukaudne lahus Aed-liivatee ürdi vedelekstrakt ja luuderohu lehtede ekstrakt.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Bronchipret ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Bronchipret`i kasutamist
3. Kuidas Bronchipret`ti kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Bronchipret`ti säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Bronchipret ja milleks seda kasutatakse

Bronchipret on taimne ravimpreparaat, mida kasutatakse ägeda bronhiidi ja kõha ravis röga lahtistava vahendina.

2. Mida on vaja teada enne Bronchipret`i kasutamist

Bronchipret`ti ei tohi kasutada

- Kui te olete ülitundlik luuderohu, aed-liivatee või teiste huulõieliste sugukonda kuuluvate taimede suhtes, samuti kase, puju, selleri või ravimi mõne teise koostisosa suhtes.
- Alla 1 aasta vanustel lastel.

Hoidatused ja ettevaatusabinõud

Enne lahuse Bronchipret kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui kaebused kestavad kauem kui 7 päeva, hingelduse, palaviku ning mädase või verise röga korral tuleb viivitamatult konsulteerida arstiga.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Lapsed

Ravimit Bronchipret mitte anda alla 1-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Bronchipret

Koostoimed teiste ravimitega ei ole teada.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Bronchipret koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ei ole teada.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Piisavate uuringute puudumise tõttu ei tohi lahust Bronchipret kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kasutatuna ettenähtud annustes ei mõjuta ravim autojuhtimise ega masinate käsitlemise võimet.

Bronchipret sisaldab alkoholi

Bronchipret sisaldab 300 mg alkoholi (etanol) 5,4 ml-s, mis vastab 56 mg/ml (7% v/v). Alkoholi sisaldus selle ravimi 5,4 ml-s on võrdne 8 ml õlle või 3 ml veiniga. Alkoholi kogus selles ravimis ei oma tõenäoliselt toimet täiskasvanutele ja noorukitele. Toime lastele ei ole märkimisväärne. Võib esineda mõningane toime väikelastele, nt unisus.

Ravimis sisalduva alkoholi kogus võib mõjutada teiste ravimite toimet. Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui kasutate teisi ravimeid.

Kui olete rase või imetate, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil esineb alkoholi liigtarvitamist, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Bronchipret sisaldab tsüklodekstriini

Bronchipret sisaldab 90,8 mg hüdroksüpropüülbetadeksi (tsüklodekstriini) 5,4 ml-s, mis vastab 16,8 mg/ml.

3. Kuidas Bronchipret`ti kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, siis võtke lahust Bronchipret kaasasoleva mõõtetopsiga 3 korda päevas. Annus sõltub patsiendi vanusest (vt alljärgnev tabel).

Vanus	Annus ml (3 korda päevas)	Päevane annus
Lapsed vanuses 1...5 eluaastat	3,2 ml	9,6 ml
Lapsed vanuses 6...11 eluaastat	4,3 ml	12,9 ml
Noorukid alates 12. eluaastast ja täiskasvanud	5,4 ml	16,2 ml

Võtke Bronchipret`ti lahjendamata, soovi korral võib pärast juua vett. Enne kasutamist loksutada.

Ravikuuri pikkus sõltub haiguse raskusest. Kui kaebused kestavad kauem kui 7 päeva, hingelduse, palaviku ning mädase või verise röga korral tuleb viivitamatult konsulteerida arstiga (vt lõik 2 "Hoiatused ja ettevaatusabinõud" ja lõik 4 "Võimalikud kõrvaltoimed").

Kui te võtate Bronchipret`ti rohkem, kui ette nähtud

Suure üleannustamise korral võivad esineda maovaevused, oksendamine ja kõhulahtisus. Sellisel juhul võtke ühendust arstiga, kes otsustab, milliseid vajalikke meetmeid kasutada.

Kui te unustate Bronchipret`ti võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravimi kasutamist nii nagu on soovitanud arst või nii nagu on kirjeldatud lõigus 3 "Kuidas Bronchipret`ti kasutada".

Kui te lõpetate Bronchipret`i võtmise

Üldiselt ei põhjusta Bronchipret`i kasutamise lõpetamine probleeme.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage ($\geq 1/10$)	Sage ($\geq 1/100$ kuni $< 1/10$)
Aeg-ajalt ($\geq 1/1000$ kuni $< 1/100$)	Harv ($\geq 1/10000$ kuni $< 1/1000$)
Väga harv ($< 1/10,000$), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)	

Kui teil tekib mõni allpool loetletud kõrvaltoime, lõpetage Bronchipret'i võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Mõnikord võib esineda seedetrakti häireid nagu spasmid (lihaste kramplikud kokkutõmbed) kõhus, iiveldus ja oksendamine.

Harva võib esineda ülitundlikkusreaktsioone nagu punetus, hingeldamine, nõgestõbi, näo-, suu- ja/või kõriturse.

Esimeste ülitundlikkusreaktsioonide ilmnemisel lõpetage Bronchipret'i kasutamine.

Kõrvaltoimete korral lõpetada Bronchipret'i manustamine ja konsulteerida arstiga.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Bronchipret'i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Bronchipret'ti pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Teatud tingimustes võib tekkida kerge hägu või sade, mis siiski ei mõjuta ravimi toimet.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 6 kuud.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bronchipret sisaldab

- Toimeained on aed-liivatee ürdi vedelekstrakt ja luuderohu lehtede ekstrakt.
1 ml lahust Bronchipret sisaldab: aed-liivatee ürdi vedelekstrakti (1:2-2,5, ekstrahendid 10% ammoniaagilahus, 85% glütserool, 90% etanool, vesi (1:20:70:109)) 169,49 mg; luuderohu lehtede ekstrakti (1:1, ekstrahent 70% etanool) 16,95 mg.
- Abiained on sidrunhappe monohüdraat, puhastatud vesi, kaaliumsorbaat, maltitooli lahus, hüdroksüpropüülbetaadeks.

Kuidas Bronchipret välja näeb ja pakendi sisu

Bronchipret on helepruun, selge, aromaatselt lõhnaga vedelik, mis on pakendatud 50 ml ja 100 ml pudelitesse.

Informatsioon diabeetikutele

Täiskasvanu ühekordne annus (5,4 ml) Bronchipret´ti sisaldab keskmiselt 0,18 süsivesiku vahetusühikut.

Müügiloa hoidja ja tootja

Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D-92318 Neumarkt
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Oribalt Tallinn
Kõrtsi tee 9
75306 Lehmja, Harjumaa
Eesti
Tel.: +372 6515 100

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2022.