

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Septolete plus, 5 mg/1 mg losengid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Septolete plus ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Septolete plus'i võtmist
3. Kuidas Septolete plus'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Septolete plus'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Septolete plus ja milleks seda kasutatakse

Septolete plus imemistabletid avaldavad paikset valuvaigistavat ja mikroobidevastast toimet, Nad desinfitseerivad suuõõnt ja neelu ning leevendavad paikset valu.

Imemistablettides sisalduv antiseptiline aine tsetüülpiridiinkloriid lõhustab mitmesuguseid baktereid ning pärsib mõningal määral ka viiruste ja seente arenemist. Sellisel viisil leevendab ta suuõõnes ja neelus esinevat põletikku ning aitab ära hoida märksa raskema bakteriaalse põletiku teket. Kuna tsetüülpiridiinkloriid jaotub kergesti ning vähendab pindpinevust, tungib ta ka suuõõne ja neelu limaskesta raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse ja pärsib ka seal bakterite kasvu.

Bensokaiin on lokaalne valuvaigisti, mis sobib suuõõne ja neelu infektsioonide ning põletikega sageli kaasneva valuliku neelamise leevendamiseks.

Septolete plus imemistabletid sisaldavad polüoole maltitooli ja mannitooli. Ravim ei sisalda suhkrut, mida bakterid kasvuks vajavad. Septolete plus imemistabletid sobivad diabeetikutele, nad ei põhjusta hambakaariest ning nende antiseptiline toime on märksa parem kui suhkrut sisaldavatel preparaatidel.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Septolete plus'i võtmist

Ärge võtke Septolete plusi:

- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Septolete plus'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke soovitatutest suuremaid annuseid!

Teadmiseks diabeetikutele: Üks imemistablett sisaldab umbes 1 g maltitooli. Kuna maltitool hüdrolüüsib ning imendub seedetraktist aeglaselt, avaldab ta veresuhkru tasemele vähest mõju. Samuti on maltitooli energeetiline väärtus (10 kJ/g ehk 2,4 kcal/g) tunduvalt madalam suhkru omast.

Lapsed ja noorukid

Septolete plus ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele.

Septolete plus imemistabletid sisaldavad polüoole. Polüoolid võivad suurtes annustes põhjustada kõhulahtisust, seda ennekõike lastel.

Muud ravimid ja Septolete plus

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ühtegi koostoimet ei ole seni täheldatud.

Septolete plus koos toidu ja joogiga

Ärge manustage Septolete plusi vahetult enne sööki ega koos piimaga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedad ja last rinnaga toitvad naised võivad Septolete plus imemistablette kasutada ainult oma arsti soovitusel, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku ohu lootele/lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teateid Septolete plus imemistablettide autojuhtimise või masinate käsitlemise võimet halvendava toime kohta ei ole.

Septolete plus losengid sisaldavad maltitooli ja vedelat maltitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

3. Kuidas Septolete plusi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on kuni 8 imemistabletti ööpäevas. Laske iga 2...3 tunni järel ühel imemistabletil suus sulada.

Soovitatavaks annuseks 6...12-aastastele lastele on kuni 4 imemistabletti ööpäevas. Selles vanuses lapsed peavad iga 4 tunni järel ühel imemistabletil suus sulada laskma.

Kui te võtate Septolete plusi rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Arvestades imemistablettide toimeainete väikest sisaldust on üleannustamise oht minimaalne. Liiga suure koguse imemistablettide sissevõtmisel võivad tekkida seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Selliste nähtude tekkimisel katkestage imemistablettide võtmine, jooge rohkelt vett või piima ja konsulteerige oma arstiga.

Kui te unustate Septolete plus'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui Septolete plus imemistablette kasutatakse vastavalt soovitudele, tekib kõrvaltoimeid väga harva. Tundlikel inimestel võivad soovitatust suuremate annuste kasutamisel seedetrakti limaskesta ärrituse tõttu tekkida seedetrakti häired.

Inimestel, kellel esineb ülitundlikkust ravimi mõne koostisosa suhtes, võivad tekkida allergilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Septolete plusi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Septolete plus sisaldab

- Toimeained on bensokaiin ja tsetüülpüridiinkloriid. Üks loseng (imemistablett) sisaldab 5 mg bensokaiini ja 1 mg tsetüülpüridiinkloriidi.
- Teised koostisosad on: piparmündi eeterlik õli, levomentool, vedel maltitool, maltitool, mannitool, glütserool, kastoorõli, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba räni, povidoon, farmatseutilised vahad, titaandioksiid (E171), sinine värvaine V (E131).

Kuidas Septolete plus välja näeb ja pakendi sisu

Sinised, ümmargused, kaksikkumerad ja läikivad losengid.

Saadaval on 18 või 30 losengi blisterpakendis ja karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.