

## PAKENDI INFOLEHT

Chorulon, 1500 RÜ/viaalis süstelahuse pulber ja lahusti veistele, hobustele, koertele.

### 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja:

Intervet International BV  
Wim de Korverstraat 35  
NL-5831 AN Boxmeer  
Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Intervet International GmbH  
Feldstrasse 1a  
85716 Unterschleissheim  
Saksamaa

Intervet International BV  
Wim de Korverstraat 35  
NL-5831 AN Boxmeer  
Holland

### 2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Chorulon, 1500 RÜ/viaalis süstelahuse pulber ja lahusti veistele, hobustele, koertele.

### 3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

**Toimeaine(d):**

1 viaal sisaldab:

Inimese kooriongonadotropiin: 1500 RÜ

**Abiained:**

Süstelahuse pulber: mannitool, dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat.

Lahusti: dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, süstevesi.

### 4. NÄIDUSTUS(ED)

Veis: Tiinestumise parandamine,  
nümfomaania,  
anöstrus,  
ovariaaltsüstid koos ebaregulaarse östraaltsükliga.

Hobune: Ovulatsiooni indutseerimine,  
anöstrus.

Koer: Ovulatsiooni indutseerimine,  
anöstrus,  
hilinenud ovulatsioon, pikenenud proöstrus,  
isastel koertel krüptorhism või nõrk libiido.

## 5. VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

## 6. KÕRVALTOIMED

Nagu kõigi valguliste preparaatide puhul võib harvadel juhtudel Choruloni manustamise järel tekkida anafülaktiline reaktsioon. Anafülaktiliste reaktsioonide ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

## 7. LOOMALIIGID

Veis, hobune, koer.

## 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramuskulaarseks või intravenoosseks manustamiseks.

### MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Loomaliik	Näidustus	Annus ja manustamine
Veis (lehm, mullikas)	Tiinestumise parandamine	Inna ajal 1500 RÜ i.m. koos seemenduse või paaritamisega.
	Ovariaaltsüstid (anöstrus, pikenenud östrus, nümfomaania)	3000 RÜ i.v.
Hobune (mära)	Anöstrus (folliikulid diameetriga $\geq 2$ cm)	1500...3000 RÜ i.m. või i.v., vajadusel korrata 2 päeva möödumisel.
	Ovulatsiooni indutseerimine (folliikulid diameetriga $\geq 3,5$ cm)	1500...3000 RÜ i.m. või i.v., 24 tundi enne seemendust või paaritamist.
Emane koer	Anöstrus	Pärast eelravi seerumgonadotropiiniga, 500 RÜ i.m. või i.v. östruse esimesel päeval.
	Hilinenud ovulatsioon, pikenenud östrus	100...800 RÜ/päevas i.m., korrata kuni veritsus tupest kaob.
Isane koer	Krüptorhism – eeldusel, et kubemekanal on avatud ning ravi alustatakse võimalikult varakult	100...500 RÜ i.m. kaks korda nädalas kuni 6 nädala jooksul.
	Nõrk libiido	100...500 RÜ i.m. kaks korda nädalas kuni 6 nädala jooksul või 100...500 RÜ 6...12 tundi enne paaritust.

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

V.t punkt 8.

## 10. KEELUAEG

Veis: Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.  
Piimale: 0 päeva.  
Hobune: Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.  
Koer: Ei rakendata

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.  
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist hoida külmkapis 2 °C...8 °C.  
Kõlblikusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist temperatuuril 2 °C...8 °C: 24 tundi.

## 12. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Pärast ravimi manustamist pesta käed.

Tiinus:

Mitte manustada tiinetele loomadele.

Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus):

Nagu kõigi valguliste preparaatide puhul võib ka Choruloni manustamisel harva esineda anafülaktiline reaktsioon. Anafülaktiliste reaktsioonide ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle preparaadiga.

## 13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

## 14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

september 2015

## 15. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja esindaja poole.

Intervet Baltic States  
Vasario 16-osios 9-6a,  
LT-44251 Kaunas  
Leedu

+370 37 321660