

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Soligental, 3000 RÜ/ml silmatilgad, lahus koertele ja kassidele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Müügiloa hoidja:

Virbac S.A.  
1ère Avenue 2065 M L.I.D.  
06516 Carros  
Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Virbac S.A.  
1ère Avenue 2065 M L.I.D.  
06516 Carros  
Prantsusmaa

või

Labiana Life Sciences S.A  
C/Venus 26  
Pol.Ind.Can Parellada  
Terrassa 08228, Barcelona  
Hispaania

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Soligental, 3000 RÜ/ml silmatilgad, lahus koertele ja kassidele  
*Gentamicinum*

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

1 ml lahust sisaldab:

**Toimeaine:**

Gentamütsiini (gentamütsiinsulfaadina) 3000 RÜ

**Abiained:**

Dinaatriumedetaat, parahüdroksübensoehape.

Selge, õrnkollane kuni kollane, osakestevaba, steriilne lahus.

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Koortel ja kassidel gentamütsiinile tundlike bakterite põhjustatud konjunktiviidi ja keratokonjunktiviidi ravi, mida toetab antibiootikumi tundlikkuse uuring.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust gentamütsiini, teiste aminoglükosiidide või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.

## **6. KÕRVALTOIMED**

Harvadel juhtudel on ravi alguses täheldatud paikset talumatust (konjunktivi põletikuline reaktsioon). Need reaktsioonid on väga kerged ja mööduva iseloomuga ning kaovad ilma spetsiifilist ravi vajamata.

Kui täheldate tõsisemaid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

## **7. LOOMALIIGID**

Kass, koer.

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Okulaarne.

900 RÜ gentamütsiini/päevas 8 päeva jooksul, st 2 tilka 3 korda päevas 8 päeva jooksul.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS**

Tilgutage lahus tilgadosaatori abil alumisse konjunktivikotti.

## **10. KEELUAEG**

Ei rakendata.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil pärast „EXP“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast vahetu pakendi esmast avamist kasutada 15 päeva jooksul.

## **12. ERIHOIATUSED**

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Lahuse saastumise vältimiseks sulge viaal pärast kasutamist.

Soligental tuleb hoida selliste kliiniliste seisundite raviks, mis alluvad halvasti või eeldatavalt alluvad halvasti esimese valiku ravile.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on teadaolevalt ülitundlikud aminoglükosiidide suhtes peavad vältima kokkupuudet selle ravimiga.

Peske pärast ravimi kasutamist käed.

#### Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Gentamütsiin läbib platsentaarbarjääri ja võib seetõttu tekitada lootel toksilisi toimeid, juhul kui emasloomale manustatakse väga suuri annuseid. Soligental on oftalmoloogiline lahus ja gentamütsiini süsteemne imendumine on ebaoluline. Seetõttu tohib ravimit kogu tiinuse ja laktatsiooni ajal kasutada.

#### Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üleannustamise korral võib kornea epiteeli regenereerumise aeg pikeneda.

### **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata jäänud veterinaarravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Mai 2018

### **15. LISAINFO**

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.