

PAKENDI INFOLEHT
Febrivac 3-PLUS, süstesuspensioon minkidele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau
Saksamaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Febrivac 3-PLUS, süstesuspensioon minkidele

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks annus (1 ml) sisaldab:

Toimeained:

Naaritsate enteriidi inaktiveeritud viirus vähemalt $10^{4,0}$ TCID₅₀ *

Clostridium botulinum tüüp C toksoid vähemalt 0,5 rU *

Inaktiveeritud *Pseudomonas aeruginosa* bakterid,
Hab'i serotüübid 5, 6 ja 7/8 vähemalt 10^8 rakku serotüübi kohta *

* enne inaktiveerimist

TCID₅₀ 50 % koekultuuri nakatav annus

rU - toksiini suhteline sisaldus määratuna ELISA meetodil võrdluses referentsmaterjaliga

Adjuvant: alumiiniumhüdroksiid mitte üle 7,5 mg

Abiained: formaldehüüd mitte üle 1,5 mg

Kollakaspruun kuni punakaspruun piimjas hägune suspensioon.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Minkide aktiivne immuniseerimine viirusliku enteriidi, hemorraagilise pneumoonia ning *Clostridium botulinum* i C tüüpi toksiini põhjustatud toksikoosi vastu.

Immuunsuse teke: 3 nädalat pärast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus: 12 kuud pärast vaktsineerimist.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, adjuvandi või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

6. KÕRVALTOIMED

Süstekohas võib olla hajus kõva või pehme turse (läbimõõt mitte üle 1,5 cm), mis tavaliselt kaob 4-6 nädala jooksul ilma ravita.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

7. LOOMALIIGID

Mink (*Neovison vision*).

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Subkutaane manustamine.

Mingipoegade esmane immuniseerimine

Esimene vaksineerimine tehakse 6. kuni 8. elunädalal. Kui esimene immuniseerimine oli mõjutatud maternaalsest immuunsusest, tuleb teha teine vaksineerimine 3...5 nädala pärast.

Suguloomad

Vaksineerida tuleb vähemalt neli nädalat enne paaritust.

Revaksineerimine

Loomi tuleb revaksineerida kord aastas.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Enne kasutamist loksutada.

10. KEELUAEG

Ei rakendata.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C - 8°C).

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 8 tundi.

12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Vaksineerida ainult terveid loomi.

Mitte vaksineerida transpordi või ümberpaigutamise tõttu nõrku loomi.

Mitte manustada intramuskulaarselt.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Mingipojad tuleb esmakordselt vaktsineerida mitte enne 6. elunädalat, sest maternaalsed antikehad võivad mõjutada immuunsuse väljakujunemist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinuse perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole soovitatav.

Sigivus

Suguloomi tuleb vaktsineerida vähemalt neli nädalat enne paaritust.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed teiste vaktsiinide samaaegse kasutamise kohta, va Febrivac DIST. Seetõttu ei ole teiste vaktsiinidega vaktsineerimine soovitatav 14 päeva enne ja pärast selle preparaadiga vaktsineerimist.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Kahekordse annuse manustamisel ei täheldatud kõrvaltoimeid.

Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsi palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2018

15. LISAINFO

Pakendid: 50, 250 või 500 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.