

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Neo-Angin Cherry, losengid (suhkruvaba)

2,4-diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3...4 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Neo-Angin Cherry ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Neo-Angin Cherry võtmist
3. Kuidas Neo-Angin Cherry't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Neo-Angin Cherry't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Neo-Angin Cherry ja milleks seda kasutatakse

Neo-Angin Cherry on paikne suuõõne ja neelu antiseptiline ravim.

Kui pärast 3...4 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Neo-Angin Cherry võtmist

Ärge võtke Neo-Angin Cherry't

- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Lapsed

Neo-Angin Cherry ei sobi kasutamiseks alla 6 aasta vanustel lastel.

Neo-Angin Cherry ja muud ravimid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimeid teiste ravimitega pole täheldatud.

Neo-Angin Cherry koos toidu ja joogiga

Neo-Angin Cherry't võib võtta söögiaegadest sõltumata.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Neo-Angin Cherry suhkruvaba losengi kohta ei ole kliinilisi andmeid selle mõju kohta rasedusele. Loomkatsed ei viita samuti otsestele või kaudsetele kahjulikele toimetele rasedusele, embrüo või loote arengule, sünnitusele või sünnijärgsele arengule.

Kuna ebapiisava informatsiooni tõttu pole täielikult võimalik välistada riski lootele, ei ole selle ravimi kasutamine raseduse või imetamise ajal soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

Neo-Angin Cherry sisaldab värvainet Ponceau 4R punane (E124), bensüülalkoholi, butüleeritud hüdroksüanisooli (E320), isomaltitooli (E953)

Neo-Angin Cherry losengid sisaldavad värvainet Ponceau 4R punane (E124), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kui te olete rase või imetate või kui teil on maksa- või neeruhaigus, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Suurtes kogustes võib bensüülalkohol organismis kuhjuda ja põhjustada kõrvaltoimeid (nn "metaboolne atsidoos").

Kirsi lõhna- ja maitseaine sisaldab ka butüleeritud hüdroksüanisooli (E320), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone limaskestadel.

Neo-Angin Cherry losengid sisaldavad 2,58 g suhkruasendajat isomaltitooli (E953) ühes losengis, mis vastab ligikaudu 6 kcal-ile (26 kJ). Sellega tuleb arvestada suhkrutõbe põdevatel patsientidel.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Suhkruasendaja isomaltitool ei ole kariogeenne.

Isomaltitool võib omada kerget lahtistavat toimet.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes losengis, st on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Neo-Angin Cherry't võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud, noorukid ja üle 6 aasta vanused lapsed võivad manustada ühe losengi 2...3 tunni järel, lastes sellel aeglaselt suus sulada. Suurim ööpäevane annus on 6 losengi.

Kui 3...4 päeva möödudes haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

Kui Teil on tunne, et Neo-Angin Cherry toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Neo-Angin Cherry't rohkem kui ette nähtud

Ühestki üleannustamise juhtumist pole teatatud.

Kui te unustate Neo-Angin Cherry't võtta

Kui te olete unustanud Neo-Angin Cherry't võtta või võtnud seda vähem kui peaks, siis jätkake juhiste järgi annustamist alates järgmisest ettenähtud annusest. Ärge võtke kahekordset annust, kui loseng jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Neo-Angin Cherry kasutamise järgselt on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10 000-st):

- suuõõne ja mao limaskesta ärritus.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- allergilised reaktsioonid, nt suu- ja keeleturse.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Neo-Angin Cherry't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Neo-Angin Cherry sisaldab

- Toimeained on 2,4-diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool.

Üks loseng sisaldab 1,20 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi, 0,60 mg amüülmetakresooli, 5,90 mg levomentooli.

- Abiained on piparmündiõli, isomaltitool (E953), viinhape, kirsi lõhna- ja maitseaine (sisaldab sealhulgas bensüülalkoholi, butüleeritud hüdroksüanisooli (E320)), värvained Ponceau 4R punane (E 124) ja indigotiin (E132).

Kuidas Neo-Angin Cherry välja näeb ja pakendi sisu

Punased ümmargused kergelt läbipaistvad losengid läbimõõduga 20 mm.

Karbis on 12, 16, 24 või 48 losengi pakendatud blistritesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloo hoidja ja tootja

Divapharma GmbH
Motzener Straße 41
12277 Berliin
Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2021.