

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Neo-Angin Salvia, losengid (suhkruvaba)

2,4-diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3...4 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Neo-Angin Salvia ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Neo-Angin Salvia võtmist
3. Kuidas Neo-Angin Salvia't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Neo-Angin Salvia't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Neo-Angin Salvia ja milleks seda kasutatakse

Neo-Angin Salvia on suuõõne ja neelu paikne antiseptiline ravim.

Kui pärast 3...4 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Neo-Angin Salvia võtmist

Ärge võtke Neo-Angin Salvia't

- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Neo-Angin Salvia kasutamist konsulteerima arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Lapsed

Neo-Angin Salvia ei sobi kasutamiseks alla 6 aasta vanustel lastel.

Neo-Angin Salvia ja muud ravimid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimeid teiste ravimitega pole täheldatud.

Neo-Angin Salvia koos toidu ja joogiga

Neo-Angin Salvia't võib võtta söögiaegadest sõltumata.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Neo-Angin Salvia suhkruvaba losengi kohta ei ole kliinilisi andmeid selle mõju kohta rasedusele. Loomkatsed ei viita samuti otsestele või kaudsetele kahjulikele toimetele rasedusele, embrüo või loote arengule, sünnitusele või sünnijärgsele arengule.

Kuna ebapiisava informatsiooni tõttu pole täielikult võimalik välistada riski lootele, ei ole selle ravimi kasutamine raseduse või imetamise ajal soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

Neo-Angin Salvia sisaldab isomaltitooli (E953) ja värvainet Ponceau 4R punane (E124)

Neo-Angin losengid sisaldavad 2,58 g suhkruasendajat isomaltitooli (E953) ühes losengis, mis vastab ligikaudu 6 kcal-ile (26 kJ). Sellega tuleb arvestada suhkrutõbe põdevatel patsientidel.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Isomaltitool võib omada kerget lahtistavat toimet.

Suhkruasendaja isomaltitool ei ole kariogeenne.

Neo-Angin Salvia losengid sisaldavad värvainet Ponceau 4R punane (E124), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes losengis, st on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Neo-Angin Salvia't võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud, noorukid ja üle 6 aasta vanused lapsed võivad manustada ühe losengi 2...3 tunni järel, lastes sellel aeglaselt suus sulada. Suurim ööpäevane annus on 6 losengi.

Kui 3...4 päeva möödudes haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

Kui Teil on tunne, et Neo-Angin Salvia toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Neo-Angin Salvia't rohkem kui ette nähtud

Ühestki üleannustamise juhtumist pole teatatud.

Kui te unustate Neo-Angin Salvia't võtta

Kui te olete unustanud Neo-Angin Salvia't võtta või võtnud seda vähem kui peaks, siis jätkake juhiste järgi annustamist alates järgmisest ettenähtud annusest. Ärge võtke kahekordset annust, kui loseng jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Neo-Angin Salvia kasutamise järgselt on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10 000-st):

- suuõõne ja mao limaskesta ärritus.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- allergilised reaktsioonid, nt suu- ja keeleturse.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Neo-Angin Salvia´t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage neo-angin salvia´t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Neo-Angin Salvia sisaldab

- Toimeained on 2,4-diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool. Üks loseng sisaldab 1,20 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi, 0,60 mg amüülmetakresooli, 5,90 mg levomentooli.
- Abiained on piparmündiõli, isomaltitool (E953), viinhape, salveiõli, värvained Ponceau 4R punane (E 124), kinoliinkollane (E104) ja patentsinine V (E131).

Kuidas Neo-Angin Salvia välja näeb ja pakendi sisu

Kollakad ümmargused kergelt läbipaistvad losengid läbimõõduga 20 mm.

Karbis on 12, 16, 24 või 48 losengi pakendatud blistritesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloo hoidja ja tootja

Divapharma GmbH
Motzener Straße 41
12277 Berliin
Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2021.