

## PAKENDI MÄRGISTUS

### VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

#### Konteiner

#### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Kenocidin

Kloorheksidiindiglükonaat 5 mg/ml, nisakastutuslahus veistele (piimakari)

#### 2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Kloorheksidiindiglükonaat: 5,00 mg/ml (mis vastab kloorheksidiinile 2,815 mg/ml)

Briljantsinine 85% (E133): 0,035 mg/ml

Glütserool: 5,00 mg/ml

Allantoiin: 1,00 mg/ml

#### 3. RAVIMVORM

Nisakastutuslahus.

Sinine viskoosne vedelik.

#### 4. PAKENDI SUURUS(ED)

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 60 l, 200 l. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

#### 5. LOOMALIIGID

Veis (piimalehmad).

#### 6. NÄIDUSTUS(ED)

Nisade desinfektsiooniks lakteerivatel piimalehmadel ühe osana mastiidi ennetamise strateegiast.

Nisa naha ja nisa tipu hea seisukorra säilitamiseks.

#### 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Nisanahale manustamiseks.

Preparaat on kasutusvalmis nisakastutuslahus lüpsijärgseks kasutamiseks kuni kaks korda päevas.

Kasutada vähemalt 5 ml lehma kohta igal kasutuskorral.

Kasutada nisasid vahetult pärast iga lehma lüpsmist. Veenduda, et nisa saaksid vähemalt kolme neljandiku pikkuse ulatuses lahusesse kasutatud.

Kui vaja, tuleb kasutustopsi täita.

Kui kasutamiseks kasutatakse tavalist kasutustopsi, tuleb iga lüpsi ajal kasutada värsket lahust.

Kasutustopsi tuleb iga lüpsikorra järel või kui tops saastub lüpsi ajal, tühjendada, puhastada ja loputada. Mitte valada ülejäänud lahust kasutustopsist tagasi originaalkonteinerisse. Mitte kasutada preparaati lüpsiseadmete puhastamiseks ja/või desinfitseerimiseks.

#### 8. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

## **9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne järgmist lüpsi veenduge, et udar ja nisad oleksid puhtad ja kuivad.

Võib kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Kloorheksidiini saab inaktiveerida anioonsete ja mitteioonsete pindaktiivsete (nt seebid, ka looduslikud) ainete või mitteorgaaniliste anioonidega, seetõttu mitte segada kraaniveega, teiste kemikaalidega, desinfitseerimisvahenditega ja teiste nisa- ja udaraholdusvahenditega.

See veterinaarravim on nisanahale manustamiseks, märkimisväärset imendumist ei toimu.

### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Ravimi kasutamine nisavigastuste korral võib aeglustada haavade paranemist nisadel. Nisavigastuste korral on soovitatav ravimit mitte manustada kuni vigastused on paranenud. Orgaanilise materjali (mäda, veri jne) esinemine võib piirata kloorheksidiini desinfitseerivat toimet. Kui temperatuur on allpool külmumispunkti, laske nisadel enne lehmade väljalaskmist kuivada.

Kui ilmnevad haiguse tunnused, konsulteerige veterinaararstiga.

Laske preparaadil kuivada enne lehmade laskmist niiskuse (vihm), külma või tuule kätte.

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida silma sattumist. Ravimi silma sattumisel loputada puhta voolava veega ning pöörduda arsti poole.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel juua suures koguses vett ja pöörduda viivitamatult arsti poole ning näidata pakendi infolehte.

Hoida eemal toidust ja loomasöödast.

Pärast kasutamist pesta käed.

Inimesed, kes on kloorheksidiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet selle veterinaarravimiga vältima.

### Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Väga harvadel juhtudel võib nisakastatusvahendi toimeaine muutus põhjustada naha ärritust.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida ei ole loetletud käesoleval etiketil, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

### Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust kloorheksidiini või ravimi ükskõik milliste abiainetega suhtes.

## **10. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.

Hävitamise kuupäev: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Mitte lasta külmuda.

Kui veterinaarravim on külmunud, sulatada see soojas kohas üles ja loksutada hästi enne kasutamist.

Hoida valguse eest kaitstult.  
Mitte kasutada pärast kuupäeva, mis on märgitud etiketil.  
200-liitrilist konteinerit ei pea tagastama uuesti täitmiseks.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.  
KAHJULIK KALADELE JA TEISTELE VEEORGANISMIDELE.  
Ravim ega kasutatud konteinerid ei tohi sattuda tiikidesse, kraavidesse ega teistesse veekogudesse.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED  
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON  
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

**14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress:

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

Belgia

Tel. +32 (0) 57 21 78 77

Fax. +32 (0) 57 21 78 79

Mail: [info@cidlines.com](mailto:info@cidlines.com)

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

1659

**17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER**

Partii nr: