

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Canergy vet, 100 mg tabletid koertele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Müügiloa hoidja:  
Le Vet. Beheer B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja:  
Artesan Pharma GmbH & Co KG  
Wendlandstrasse 1  
29439 Lüchow  
Saksamaa

või

Lelypharma B.V.  
Zuiveringweg 42  
8243 PZ Lelystad  
Holland

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Canergy vet, 100 mg tabletid koertele  
propentofülliin

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

Üks tablett sisaldab:

**Toimeaine:**  
Propentofülliin                      100 mg

Helepruun, pruunide täppidega, ümmargune ja kumer tablett, mille ühel küljel on ristikujuline poolitusjoon.

Tablette saab jagada 2 või 4 võrdseks osaks.

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Perifeersete ja aju veresoonte verevarustuse parandamiseks. Loiduse, letargia ja üldseisundi parandamiseks koertel.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada alla 5 kg kaaluvatel koertel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Vt ka lõiku kasutamise kohta tiinuse ja laktatsiooni perioodil.

## 6. KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) on esinenud allergilisi nahareaktsioone, oksendamist ja südametegevuse häireid. Neil juhtudel tuleb ravi katkestada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

























Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## 7. LOOMALIIGID


Koer.


## 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD


Tavapärane annus on 6–10 mg propentofüllini 1 kg kehamassi kohta ööpäevas, jagatuna kaheks annuseks järgmiselt:

100 mg tabletid				
Kehamass (kg)	Hommikul	Õhtul	Tablettide arv ööpäevas kokku	Ööpäevane annus kokku (mg/kg)
5 kg – 8 kg			½	6,25 – 10,0
> 8 kg – 10 kg			¾	7,5 – 9,4
> 10 kg – 15 kg			1	6,7 – 10,0
> 15 kg – 25 kg			1 ½	6,0 – 10,0
> 25 kg – 33 kg			2	6,1 – 8,0
> 33 kg – 49 kg	 	 	3	6,1 – 9,1
> 49 kg – 66 kg	 	 	4	6,1 – 8,2
> 66 kg – 83 kg	  	  	5	6,0 – 7,6

 = ¼ tabletti

 = ½ tabletti

 = ¾ tabletti


 = 1 tablett

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Õige annuse tagamiseks tuleb enne ravi alustamist võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass.

Tabletid võib manustada otse suhu, koera keele tagaosale, või segada väikesesse toidupalli, ning manustada vähemalt 30 minutit enne söötmist.

Täpse annuse tagamiseks võib tablette jagada kaheks või neljaks võrdseks osaks. Asetage tablett tasasele pinnale, poolitusjoontega külg ülespidi ja kumer (ümar) külg allpool.



Poolitamine: vajutage pöialdega tableti mõlemale poolele.

Neljaks jagamine: vajutage pöidlaga tableti keskele.

## 10. KEELUAEG

Ei rakendata.

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Osadeks jagatud tablettide kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 4 päeva.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Tableti kasutamata osa tuleb avatud blistrisse tagasi panna ja blister panna pappkarpi tagasi, et seda järgmisel manustamiskorral kasutada.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

## 12. ERIHOIATUSED

### Erihoiatused kasutamisel loomadel

Ei asenda põhihaiguse (nt neeruhaiguse) spetsiifilist ravi.

Koortel, kes saavad juba südame paispuudulikkuse või bronhide haiguse ravi, tuleb kaaluda medikamentoosse ravi ratsionaalsemaks muutmist.

Neerupuudulikkuse korral tuleb annust vähendada.

Tabletid on maitsestatud. Juhusliku allaneelamise vältimiseks tuleb hoida tablette loomadele kättesaamatus kohas.

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida ravimi juhuslikku allaneelamist.

Juhuslikul tablettide allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast kasutamist pesta käed.

Tableti kasutamata osa tuleb panna tagasi avatud blistrisse ja blister tagasi karpi ning kasutada ära järgmisel manustamiskorral.

### Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja/või laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole kasutamine tiinuse või laktatsiooni ajal ega aretusloomadel soovitatav.

### Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Erutustahhükardia, hüpotensioon, limaskestade punetus ja oksendamine.

Ravi lõpetamisel kaovad need nähud spontaanselt.

Sobimatus

Ei rakendata.

**13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI SELLE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Mai 2020

**15. LISAINFO**

Alumiinium-PA/ALU/PVC-blister.

Pappkarp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 või 50 blistriga, igas blistris 10 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja poole.