

## PAKENDI INFOLEHT

Vitamin AD<sub>3</sub>E bela-pharm, süstelahus hobustele, veistele, sigadele ja koertele

### 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Saksamaa

### 2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vitamin AD<sub>3</sub>E bela-pharm, süstelahus hobustele, veistele, sigadele ja koertele  
retinoolpalmitaat/kolekaltsiferool/ $\alpha$ -tokoferoolatsetaat

### 3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

#### Toimeained:

Retinoolpalmitaat 176,47 mg (vastab 300 000 RÜ A-vitamiinile)

Kolekaltsiferool 100,0 mg (vastab 100 000 RÜ D<sub>3</sub>-vitamiinile)

$\alpha$ -tokoferoolatsetaat (E-vitamiin) 50,00 mg

#### Abiained:

Keskmise ahelaga triglütseriidid

Selge, kollane lahus.

### 4. NÄIDUSTUS(ED)

Vitamiinide A, D<sub>3</sub> ja E puuduse ning sellest tingitud haigusseisundite ravi.

### 5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada toiduloomadel, kellel on piisav A-vitamiini varu, sest ravim võib akumuleeruda söödavates kudedes.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

### 6. KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## 7. LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, koer.

## 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Subkutaansiks (koer) või intramuskulaarsiks (hobune, veis, siga, koer) manustamiseks.  
Seda veterinaarravimit ei tohi toiduloomadele subkutaanselt manustada.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Hobune:            | 2...4 ml       |
| Vars:              | 0,4...1 ml     |
| Veis:              | 5 ml           |
| Vasikas:           | 2 ml           |
| Siga:              | 1 ml           |
| Põrsas (≤ 10 kg):  | 0,1...0,2 ml   |
| Võõrdepõrsas:      | 0,2...0,4 ml   |
| Koer (≤ 10 kg):    | 0,05 ml        |
| Koer (11...20 kg): | 0,08 – 0,12 ml |
| Koer (21...30 kg): | 0,15 – 0,2 ml  |
| Koer (31...50 kg): | 0,3 ml         |

Toiduloomadele tohib veterinaarravimit manustada ainult üks kord ja soovitatavat annust ei tohi ületada.

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõik „Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod“.

## 10. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele:

Veis: 259 päeva.

Siga: 194 päeva.

Hobune: 250 päeva.

Piimale: 120 tundi (5 päeva).

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

## 12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhusliku enesesüstimise korral ei saa välistada hüpervitamiinooosi riski seoses A-vitamiiniga. Seetõttu tuleb ravimit manustada väga ettevaatlikult.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

A-vitamiini uuringud laboriloomadel on näidanud teratogeenset toimet. Seetõttu ei tohi seda veterinaarravimit käsitseda rasedad naised.

### Tiinus ja laktatsioon

On tõendeid A-vitamiini suurte annuste teratogeensest toimest inimestele ja laboriloomadele.

Veterinaarravimi ohutus sihtloomaliikide tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole kindlaks tehtud.

Seetõttu võib seda ravimit kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski hinnangule.

### Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

A-vitamiini märkimisväärne üleannustamine võib põhjustada hüpervitamiinooosi, mille sümptomiteks on uimasus, liikumishäired ja oksendamine.

Üleannustamisel tiinetel loomadel, eriti tiinuse varases järgus, on täheldatud loote imendumise, surnultsündide ja väärarendite sagenemist.

### Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

## **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

## **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

September 2021

## **15. LISAINFO**

### Pakendi suurused

100 ml klaasviaalid 1, 6 või 12 kaupa pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügihoa hoidja poole.

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

D- 49377 Vechta

e-mail: [info@bela-pharm.com](mailto:info@bela-pharm.com)

Tel.: +49 4441 873 0