

PAKENDI INFOLEHT

Menbutil, 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, hobustele, lammastele ja kitsedele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Saksamaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Saksamaa

Industrial Veterinaria, S.A.
Esmeralda 19
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Hispaania

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Menbutil, 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, hobustele, lammastele ja kitsedele
menbutoon

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab:

Toimeaine:

Menbutoon 100,0 mg

Abiained:

Klorokresool 2,0 mg

Natriummetabisulfit (E223) 2,0 mg

Selge, kergelt kollakas lahus.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Maksafunktsiooni ja seedekulglä töö stimuleerimine seedehäirete ja maksapuudulikkuse korral.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Mitte kasutada südamehaigust põdevatel loomadel ega tiinuse lõppjärgus.

6. KÕRVALTOIMED

Pärast intravenooset manustamist võib esineda suurenenud süljeeritust, pisaravoolu, lihasvärinaid, spontaanseid urineerimist ja roojamist.

Pärast intramuskulaarset manustamist võib tekkida reaktsioon süstekohas (turse, verejooks, nekroos (koekärbus)).

Aeg-ajalt täheldatakse rahutust ja suurenenud hingamissagedust.

Harvadel juhtudel võib esineda mööduvat lamama jäämist, eriti veistel ja kiire intravenoosse süstimise järgselt.

Väga harvadel juhtudel võib tekkida anafülaktsialaadseid reaktsioone (ülitundlikkusreaktsioone), mida tuleb ravida sümptomaatiliselt.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud)

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaaravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

7. LOOMALIIGID

Veis, siga, hobune, lammas ja kits.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Vasikad (kuni 6-kuused), lambad, kitsed ja sead

10 mg menbutooni ühe kg kehamassi kohta sügava intramuskulaarse või aeglase intravenoosse süstena; vastab 1 ml süstelahusele 10 kg kehamassi kohta.

Veised

5...7,5 mg menbutooni ühe kg kehamassi kohta aeglase intravenoosse süstena; vastab 1 ml süstelahusele 15...20 kg kehamassi kohta.

Hobused

2,5...5 mg menbutooni ühe kg kehamassi kohta aeglase intravenoosse süstena; vastab 1 ml süstelahusele 20...40 kg kehamassi kohta.

Vajaduse korral võib ravimi manustamist 24 tunni pärast üks kord korrata.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Lõigus „Kõrvaltoimed“ kirjeldatud kõrvaltoimete ennetamiseks on soovitatav ravimi aeglane intravenoosne manustamine (süste ei tohi kesta alla ühe minuti).

Intramuskulaarse manustamise korral ei ole ühte manustamiskohta soovitatav süstida rohkem kui 20 ml.

10. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget „Kõlblik kuni”.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Lõigus „Kõrvaltoimed“ kirjeldatud kõrvaltoimete ennetamiseks on soovitatav ravimi aeglane intravenoosne manustamine (süste ei tohi kesta alla ühe minuti).

Intramuskulaarse manustamise korral ei ole ühte manustamiskohta soovitatav süstida rohkem kui 20 ml.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ravimi käsitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Juhuslik ravimi süstimine iseendale võib esile kutsuda ärritust.

Inimesed, kes on menbutooni suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus

Mitte kasutada tiinuse viimasel trimestril.

Laktatsioon

Seda ravimit võib manustada lakteerivatele loomadele.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Kuna menbutooni ohutusteave puudub, tuleb soovitatavatest annustest rangelt kinni pidada.

Südameblokaadi tekkimisel tuleb kasutada kardiovaskulaarseid ravimeid.

Sobimatus

Mitte manustada lahustega, mis sisaldavad:

- kaltsiumi
- prokaiinpenitsilliini
- B-vitamiinide kompleksi

**13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisjäätmetega.
Küsi palun oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Jaanuar 2022

15. LISAINFO

100 ml läbipaistev I tüüpi klaasist mitmeannuseline viaal bromobutüülist punnkorgi ning gofreeritud alumiiniumkattega. Karbis 1 x 100 ml või 12 x 100 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaaravimi kohta pöörduge palun müügihoa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16,

Laagri 76401,

Eesti Vabariik

Tel: +372 650 1920

E-mail: vet@magnum.ee