

## PAKENDI INFOLEHT: TEAVE PATSIENDILE

### Aciclovir Agepha 30 mg/g silmasalv atsikloviir

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Aciclovir Agepha silmasalv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Aciclovir Agepha silmasalvi kasutamist
3. Kuidas Aciclovir Agepha silmasalvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Aciclovir Agepha silmasalvi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### 1. Mis ravim on Aciclovir Agepha silmasalv ja milleks seda kasutatakse

Aciclovir Agepha's sisalduv toimeaine atsikloviir kuulub viirusvastaste ravimite rühma.

Aciclovir Agepha silmasalvi kasutatakse täiskasvanutel *herpes simplex* viiruse poolt põhjustatud silmapõletiku raviks. Selle toimeks on viiruste arengu peatamine või hävitamine silmamuna esiküljel (sarvkestal).

#### 2. Mida on vaja teada enne Aciclovir Agepha silmasalvi kasutamist

##### Ärge kasutage Aciclovir Agepha silmasalvi:

- kui olete atsikloviiri, valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

#### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aciclovir Agepha kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

- Kasutage Aciclovir Agepha silmasalvi ainult silma peal
- Pärast manustamist võib teil tekkida kerge nõelamise- ja põletustunne.
- Võib esineda kiireid ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas angioödeemi, näo turset jne. Selliste ülitundlikkusreaktsioonide korral pöörduge kohe arsti poole.
- Kui teil tekivad allergilised reaktsioonid, nagu silmalau sügelus, silma turse või punetus, katkestage ravi Aciclovir Agepha silmasalviga ja konsulteerige arstiga.
- Palun võtke kohe ühendust oma arstiga, kui mõni sümptom muutub tõsiseks või kordub.

Aciclovir Agepha ravi ajal ei tohi kontaktläätsi kanda.

#### Lapsed ja noorukid

Sama nagu täiskasvanutel.

#### Muud ravimid ja Aciclovir Agepha

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Lokaalsel silma manustamisel ei ole seni täheldatud märkimisväärseid koostoimeid.

Siiski ei ole piisavalt teavet Aciclovir Agepha silmasalvi kasutamise ja samaaegselt kortikosteroidide sisaldavate silmaravimite kasutamise kohta. Arst otsustab, kas see sobib teile.

### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Aciclovir Agepha silmasalvi võib kasutada raseduse või imetamise ajal, kuna ettenähtud annustes kasutamisel ei ole oodata kõrvaltoimeid rasedusele, lootele või vastsündinud lapsele.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Oma olemuse tõttu võib see ravim põhjustada ajutisi nägemishäireid. Seetõttu tuleb mootorsõidukite juhtimisel, kindla toeta kohas töötamisel ja masinatega töötamisel olla eriti ettevaatlik.

## **3. Kuidas Aciclovir Agepha silmasalvi kasutada**

### **Manustamisviis**

Okulaarseks kasutamiseks

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, on soovitatav annus:

5 korda päevas (iga 4 tunni tagant) pigistage 1 cm salvi alumise konjunktiivikotti. Soovitatavad kellaajad on: **7:00, 11:00, 15:00, 19:00 ja 23:00.**

Tõmmake alumine laug alla ja pigistage salvi riba konjunktiivikotti. Sulgege silmalaud ja roteerige oma silmamune nii, et salv jaotuks paremini.

On oluline, et te manustaksite Aciclovir Agepha't silma regulaarselt päeva jooksul 4 tunniste vahedega, et tagada ravi edukus. Kui sarvkesta põletik on paranenud, jätkake ravi vähemalt 3 päeva.

### **Kasutamine lastel ja noorukitel**

Sama nagu täiskasvanutel.

### **Kui kasutate Aciclovir Agepha rohkem kui ette nähtud**

Pöörduge oma arsti või apteekri poole, kui olete kasutanud liiga suures koguses Aciclovir Agepha.

Aciclovir Agepha on mõeldud silmas kasutamiseks, kui olete ravimit alla neelanud, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

### **Kui te unustate Aciclovir Agepha silmasalvi manustada**

Kui te unustate Aciclovir Agepha't kasutada, manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg manustada järgmine annus, siis jätkake unustatud annus vahele. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

### **Kui te lõpetate Aciclovir Agepha silmasalvi kasutamise**

Ärge lõpetage või muutke Aciclovir Agepha silmasalv kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Kui soovite ravi lõpetada, siis rääkige sellest kõigepealt oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Aciclovir Agepha põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Vahetult pärast silmasalvi manustamist võib tekkida mööduv kerge nõelamis- või põletustunne. Kui märkate näo paistetust, angioödeemi jne, lõpetage Aciclovir Agepha kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole.

Väga harvad (võivad esineda vähem kui 1 inimesel 10,000-st) allergilised reaktsioonid

Kui teil on allergiline reaktsioon või äge ülitundlikkusreaktsioon, lõpetage Aciclovir Agepha kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole.

Nähud võivad olla järgmised:

- nahalööve, sügelus või nõgestõbi
- näo, huulte, keele või teiste kehaosade turse
- õhupuudus, vilistav hingamine või hingamisraskused
- seletamatu palavik (kõrge temperatuur) ja minestamistunne, eriti püsti tõustes.

Muud kõrvaltoimed on:

*Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):*

põletustunne või ärritus, fotofoobia / valgustundlikkus või tunne, nagu oleks midagi silmas (pindmine punktkeratopaatia)

See ei nõua tavaliselt ravi lõpetamist ja paraneb kohe

*Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):*

mööduv kerge nõelamis- või põletamistunne kohe pärast manustamist paistes, vesised silmad (konjunktiviit)

*Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):*

paistes, punased, ärritunud, sügelevad silmalaud (blefariit)

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsisemaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.raviamet.ee](http://www.raviamet.ee) kaudu. [Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.](#)

#### 5. Kuidas Aciclovir Agepha 30 mg/g silma salvi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Tarvitada ära 4 nädala jooksul pärast esmast avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Aciclovir Agepha sisaldab:**

Toimeaine on atsükloviir. 1 g salvi sisaldab 30 mg atsükloviiri. Teine abiaine on valge vaseliin.

### **Kuidas Aciclovir Agepha välja näeb ja pakendi sisu:**

Ühes karbis on 4,5 g valget kuni valkjast-halli silmasalvi sisaldav alumiiniumtuub polüetüleenist korgi ja polüetüleenist otsikuga.

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

AGEPHA Pharma s.r.o

Diaľničná cesta 5

Senec

903 01

Slovakkia

**Infolehte on viimati uuendatud aprillis 2019.**