

PAKENDI INFOLEHT
Ampiclox LC, intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia

Partii vabastamise eest vastutav tootja:
Haupt Pharma Latina S.r.l.
SS 156 Km 47, 600
04100 Borgo San Michele
Itaalia

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Ampiclox LC, intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 intramammaarsüstal sisaldab:

Toimeained:

Ampitsilliini (ampitsilliinnaatriumina)	75 mg
Kloksatsilliini (kloksatsilliinnaatriumina)	200 mg

Abiained:

Butüülhüdrosüanisool, 112- hüdrosüsteariin, arahhiseõli kuni 3 g.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatel lehmadel.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada loomadel, kellel esineb teadaolevalt ülitundlikkus penitsilliinide suhtes.

6. KÕRVALTOIMED

Ei ole täheldatud.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

7. LOOMALIIGID

Veis (lakteerivad lehmad).

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramammaarseks kasutamiseks.

Manustada 1 intramammaarsüstla sisu udaraveerandi kohta iga 12 tunni järel, 3 korda.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Pärast lüpsi puhastada ja desinfitseerida nisa meditsiinilise piiritusega. Intramammaarsüstla otsik viia nisaavasse ja kerge survega kolvile surudes manustada süstla sisu udaraveerandisse. Ravitud udaraveerandit/veerandeid võib lüpsata juba järgmisel lüpsikorral.

10. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva.

Piimale: 60 tundi.

Kui lehmi lüpsatakse kaks korda päevas, võib hakata piima inimtoiduks koguma siis, kui ravimi viimasest manustamisest on möödunud 60 tundi (st 5. lüpsikorral).

Ka teiste lüpsirežiimide puhul peab veterinaararsti otsus piima inimtoiduks kogumise kohta põhinema samal perioodil viimasest ravimi manustamisest (näiteks kolm korda päevas lüpsates ja ravimit kaks korda päevas manustades võib piima inimtoiduks koguda alates 8. lüpsikorrast).

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Mitte manustada kinnislehmadele.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ravimit võib kasutada ainult kliinilise mastiidi raviks.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstituna, sisse hingamisel, suu kaudu organismi või nahale sattumisel põhjustada allergiat. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib põhjustada ristreaktsioone tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad mõnikord olla väga tõsised. Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus ja laktatsioon

Ampiclox LC on ette nähtud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatel lehmadel.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2019

15. LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.