

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Cepralock, 2,6 g intramammaarsuspensioon kinnislehmadele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Müügiloa hoidja:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Intervet International GmbH  
Feldstrasse 1a  
85716 Unterschleissheim  
Saksamaa

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Cepralock, 2,6 g intramammaarsuspensioon kinnislehmadele  
vismutsubnitraat

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

Üks 4 g intramammaarsüstal sisaldab:

**Toimeaine:**

Vismutsubnitraat 2,6 g (vastab 1,9 g vismutile)

Valge kuni kergelt kollakas homogeenne suspensioon.

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Uute intramammaarsete infektsioonide vältimine kinnisperioodil.

Lehmadel, kellel teadaolevalt ei ole udaranakkust, võib mastiidi ärahoidmiseks kinnijätmisel manustada ainult vismutsubnitraati.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada ainult seda ravimit ainsa ravimina lehmadel, kellel on kinnijätmisel diagnoositud subkliiniline mastiit. Mitte kasutada lehmadel, kellel on kinnisperioodi algul kliiniline mastiit.

Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel. Vt ka lõik "Erihoiatused".

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainetega suhtes.

**6. KÕRVALTOIMED**

Ei ole teada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## 7. LOOMALIIGID

Veis (lüpsilehmad kinnisperioodil).

## 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Ainult intramammaarseks manustamiseks.

Manustage ühe süstla sisu igasse udaraveerandisse kohe pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi (kinnijätmisel).

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS


Ravimil on kahekordne otsik. Süstla korgi saab osaliselt või täielikult eemaldada.

Soovitav on nisa nisaotsa kergelt kokku pigistada, et pasta jääks nisajuhasse ja sulgeks nisajuha otsa.


Lühike otsik: lühikese otsiku kasutamisel saab rakendada otsiku osalise sisestamise tehnikat ja süstla saab sisestada vaid nisajuhasse.

Pikk otsik: pikka otsikut võib kasutada manustamise lihtsustamiseks, näiteks närvilisel või rabeleval lehmal otsiku nisast välja libisemise vältimiseks.

1. samm. Murtava korgi eemaldamine sisestamine.



2. samm. Pika või lühikese otsiku



Ärge masseerige nisa ega udarat pärast ravimi manustamist, ravim peab jääma nisasse ja selle sulgema, mitte liikuma udarasse.

Manustamisjärgse mastiidi riski vähendamiseks tuleb vältida udarapatogeenide sattumist nisasse ravimi manustamise ajal.

Nisa tuleb kaasasolevate alkoholiga immutatud desinfitseerivate lappidega korralikult puhastada. Nisaid tuleb puhastada, kuni lapid ei ole enam nähtavalt mustad. Enne manustamist peavad nisad olema kuivad. Ravim manustada aseptiliselt ja vältige süstla otsiku saastumist. Infusiooni järel on soovitatav kasutada sobivat nisakastutuslahust või spreid.

Jahedates tingimustes võib ravimit eelnevalt soojendada toatemperatuurini, et soodustada manustatavust.

## 10. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

## 12. ERIHOIATUSED

### Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ravitavate lehmade valik peab põhinema loomaarsti poolt antud kliinilisel hinnangul. Lehmade valikukriteeriumiks praktikas võivad olla eelnevalt läbipõetud mastiidid, piima somaatiliste rakkude arv või subkliinilise mastiidi diagnoosimine üldtunnustatud teste kasutades või bakterioloogiliselt.

### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kinnislehmi on soovitatav regulaarselt jälgida kliinilise mastiidi nähtude suhtes. Kui ravimiga kinnijäetud udaraveerandis tekib kliiniline mastiit, tuleb udaraveerand enne sobiva ravi alustamist käsitsi tühjaks lüpsta.

Saastumise riski vähendamiseks ärge kastke süstalt vette.

Süstal on ühekordseks kasutamiseks.

Ravimit tuleb manustada aseptiliselt, kuna ravimil puudub antimikroobne toime.

Pärast ravimi manustamist ei tohi lehmale manustada teisi intramammaarseid ravimeid.

Lehmadel, kellel võib esineda subkliiniline mastiit, võib ravimit kasutada pärast sobiva kinnisperioodi antibiootikumi manustamist nakatunud udaraveerandisse.

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ravim võib põhjustada naha ja silmade ärritust.

Vältida sattumist nahale ja silma.

Silma või nahale sattumisel peske kokkupuutunud piirkonda põhjalikult veega.

Vismutisoolad võivad põhjustada ülitundlikkusreaktsioone. Inimesed, kes on vismutisoolade suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Kui pärast ravimiga kokkupuudet tekivad sümptomid, pöörduge arsti poole ja näidake pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Pärast kasutamist pesta käed.

Desinfitseerivad lapid:

Desinfitseerivad lapid sisaldavad isopropüülalkoholi, mis võib põhjustada naha ja silmade ärritust.

Vältida silma sattumist. Vältida pikaajalist kontakti nahaga. Vältida toote aurude sissehingamist.

Nahaärrituse vältimiseks võib kasutada kaitsekindaid. Pärast kasutamist pesta käed.

### Tiinus

Lubatud kasutada tiinuse ajal, kuna ravim ei imendu süsteemselt pärast intramammaarset manustamist.

Pärast poegimist võib vasikas ternespiima joomisel niasse tekkinud kaitsekorgi alla neelata. Ravimi allaneelamine on vasikale ohutu ega põhjusta kõrvaltoimeid.

### Laktatsioon

Ravim on mõeldud kasutamiseks kinnislehmadel. Juhuslikul ravimi manustamisel lakteerivale lehmale võib täheldada kergelt (kuni kahekordset) mööduvat somaatiliste rakkude arvu suurenemist. Sellisel juhul tuleb kaitsekork käsitsi välja lüpsta, muud ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

### Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliinilistes uuringutes on näidatud ravimi sobivust ainult kloksatsilliini sisaldavate kinnisperioodil kasutatavate ravimitega.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Lehmadel, kellele manustati soovitatud annusest kaks korda suuremaid annuseid, ei tekkinud kõrvaltoimeid.

### **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed (sealhulgas eemaldunud nisakork) tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Veebruar 2021

### **15. LISAINFO**

Pakendi suurused

Pappkarp 24 süstlaga ja alkoholiga immutatud desinfitseerivate lappidega.

Plastämber 144 süstlaga ja alkoholiga immutatud desinfitseerivate lappidega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja poole.