

PAKENDI INFOLEHT
MULTIMIN, süstelahus veistele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja:

Warburton Technology Limited
36 Fitzwilliam Square
Dublin 2
Iirimaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

LABORATOIRES BIOVE
Rue de Lorraine
B.P. 45
62510 ARQUES
Prantsusmaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MULTIMIN, süstelahus veistele

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab:

Toimeained:

Tsink	60 mg	(vastab 74,68 mg tsinkoksiidile)
Mangaan	10 mg	(vastab 20,92 mg mangaankarbonaadile)
Vask	15 mg	(vastab 26,09 mg vaskkarbonaadile)
Seleen	5 mg	(vastab 10,95 mg naatriumseleniidile)

Abiained:

Bensüülalkohol (E1519) 10,4 mg

Läbipaistev sinine süstelahus.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Mikromineraalide manustamine seleeni, vase, mangaani ja tsingi kliinilise või subkliinilise puuduse vähendamiseks tootmis- või sigimistsükli kriitilistes etappides.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada intramuskulaarselt.

Mitte kasutada, kui esineb teadaolevat ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

6. KÕRVALTOIMED

Süstimise ajal täheldatakse sageli nõrka valu ja see võib püsida esimese tunni jooksul pärast süstimist. Paiksed reaktsioonid süstekohas on väga sagedased ja hõlmavad mööduvat mõõdukat kuni raskekujulist turset, mis taandub 48 tunni jooksul ja kõvastub ning 14 päeva pärast on palpeerimisel hinnanguliselt alla 5 cm suurune.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud)

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

7. LOOMALIIGID

Veis.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Rangelt ainult subkutaanseks manustamiseks.

Annus

- kuni 1-aastased veised: 1 ml 50 kg kohta
- 1–2-aastased veised: 1 ml 75 kg kohta
- üle 2-aastased veised: 1 ml 100 kg kohta

Manustamisskeem

Manustada ühekordse annusena stressirohketel perioodidel tootmis- ja sigimistsükli jooksul või sellistele perioodidele eelnevalt, kui võib esineda kliiniline või subkliiniline nelja mikromineraali puudujääk (nt transportimisel, poegimisel, paaritamisel).

Maksimaalne annus süstekoha kohta: 7 ml.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ravimit manustada aseptiliselt.

Subkutaanse süstimise korrektsest tehnikast tuleb rangelt kinni pidada.

500 ml viaali korki võib läbistada kuni 90 korda

10. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva.

Piimale: 0 tundi.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil „EXP“ järel. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Punnkorgi esmakordsel nõelaga läbistamisel (viaali avamisel) tuleb pakendi infolehel toodud kõlblikkusaja põhjal välja arvutada kuupäev, millal pakendisse jäänud kasutamata ravim tuleb hävitada. Kõlblikkusaja lõpu kuupäev kirjutada etiketil olevasse lünka.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

12. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Täiendavat vaske, tsinki, mangaani ega seleeni ei tohi samaaegselt manustada.

Tiinus ja laktatsioon

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Hoiatused kasutajale

See ravim sisaldab VÄGA SUURES kontsentratsioonis seleeni.

Seleenimürgituse võimaliku ohu tõttu tuleb ravimi käsitlemisel olla ettevaatlik, et vältida ravimi juhuslikku süstimist iseendale.

Seleeniga juhusliku kokkupuute korral on inimestel kõige levinumad seedetrakti ja neuroloogilised sümptomid, sh iiveldus, oksendamine, tundlikkus, väsimus ja ärritus.

Suure hulga loomade süstimisel tuleb kasutada ohutut süstimissüsteemi.

Ravimi kasutamisel mitte töötada üksi.

Veenduda, et loomad on korralikult fikseeritud, sh lähikäik viibivad loomad.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale PÖÖRDUDA VEEVITAMATULT ARSTI POOLE ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti.

Pärast kasutamist pesta käed.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Pärast korduvat üleannustamist (3 järjestikust igapäevast manustamist) üks kuni kolm korda suuremas annuses kui soovitatav (s.o 3–9x soovitatav annus) ei täheldatud süsteemseid kõrvaltoimeid.

Korduvat üleannustamist (3 järjestikust igapäevast manustamist) viiekordse soovitatava annusega (s.o 15x soovitatav annus) seostatakse maksaensüümide kõrge taseme ja tsentrilobulaarse hepatotsellulaarse degeneratsiooniga, mis esines kahel loomal kaheksast.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadusandlusele. Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsi palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2021

15. LISAINFO

Vahetu pakend: läbipaistev polüetüleenereftalaadist (PET) pudel, mis on suletud halli bromobutüülkummist sulguri ja alumiiniumkorgiga.

Pakendi suurused:

Kartongkarp, mis sisaldab 1x100 ml viaali.

Kartongkarp, mis sisaldab 1x500 ml viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaaravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja poole.

Warburton Technology Limited
36 Fitzwilliam Square
Dublin 2
Iirimaa
E-mail: sales@multimin.eu