

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Aboxoma 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid apiksabaan

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Aboxoma ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Aboxoma kasutamist
3. Kuidas Aboxoma't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Aboxoma't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Aboxoma ja milleks seda kasutatakse

Aboxoma sisaldab toimeainet apiksabaan ja kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antikoagulantideks. Ravim aitab vältida verehüüvete teket, blokeerides Xa hüübimisfaktorit, mis on oluline komponent vere hüübimises.

Aboxoma't kasutatakse täiskasvanutel:

- et ennetada verehüüvete (süvaveenide tromboos) teket pärast puusa- või põlveliigese asendusoperatsiooni. Pärast puusa- või põlveliigese operatsiooni võib teil olla suurem risk verehüüvete tekkeks jalaveenides. See võib põhjustada jalgade turset kas koos valuga või ilma. Kui verehüüve liigub jalgadest kopsudesse, võib see sulgeda verevoolu ja põhjustada õhupuudust kas koos valuga rinnus või ilma selleta. See seisund (kopsuemboolia) võib olla eluohtlik ning nõuab viivitamatut meditsiinilist sekkumist.
- vältimaks verehüübe teket südames südame rütmihäiretega (kodade virvendusarütmia) patsientidel, kellel esineb vähemalt üks lisariskitegur. Verehüübed võivad lahti tulla ja liikuda ajju ning põhjustada insulti või liikuda teistesse organitesse ja takistada nendes normaalset verevoolu (teatud ka kui süsteemne emboolia). Insult võib olla eluohtlik ja nõuda otsekohest meditsiinilist sekkumist.
- et ravida verehüübeid jalaveenides (süvaveenitromboos) ja kopsuveresoontes (kopsuarteri trombemboolia) ning ennetamaks verehüüvete taasteket jalgade ja/või kopsude veresoontes.

2. Mida on vaja teada enne Aboxoma kasutamist

Aboxoma't ei tohi kasutada, kui

- **te olete** toimeaine (apiksabaan) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes **allergiline**;
- teil esineb **suur verejooks**;
- teie keha **mõnes organis on haigus** (nagu **olemasolev või hiljuti esinenud** mao- või soolehaavand, **hiljuti esinenud ajuverejooks**), mis suurendab raske verejooksu riski;

- teil on **maksahaigus**, millega kaasneb suurenenud verejooksuohut (maksakoagulopaatia);
- te **kasutate ravimeid vere hüübimise ennetamiseks** (nt varfariin, rivaroksabaan, dabigatran või hepariin), välja arvatud antikoagulantravi muutmisel, venoosse või arteriaalse kanüüli olemasolul ja teile manustatakse selle kanüüli kaudu hepariini, et seda avatuna hoida või kui teie veresoonte on südame rütmihäirete (arütmia) ravimiseks sisestatud sond (kateeterablatsioon).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui teil esineb midagi järgnevast:

- **suurenenud verejooksuohut** järgmistel juhtudel:
 - **veritsushäired**, sealhulgas trombotsüütide aktiivsuse vähenemisest põhjustatud seisundid;
 - **väga kõrge vererõhk**, mis ei allu ravile;
 - vanus kõrgem kui 75 aastat;
 - kehakaal 60 kg või vähem;
- **raske neeruhaigus või kui te saate dialüüsi**;
- **maksahaigus või varasemad maksaga seotud probleemid**. Maksatalitluse häire tunnustega patsientidel kasutatakse seda ravimit ettevaatusega.
- **kui lülisambasse oli sisestatud kanüül (kateeter) või tehti lülisambakanalisse süst** (tuimestuseks või valu leevendamiseks), siis arst soovib võtta seda ravimit mitte varem kui 5 tundi pärast kanüüli eemaldamist;
- kui teil on **südameklapiprotees**;
- kui teie arst on teinud kindlaks, et teie vererõhk on ebastabiilne, või kui teie kopsudest verehüübe eemaldamiseks on planeeritud mõni muu ravi või kirurgiline protseduur.

Ravimiga Aboxoma on vajalik eriline ettevaatus

- kui teate, et teil on antifosfolipiidsündroom (immuunsüsteemi haigus, mis suurendab trombide tekkeriski). Teatage sellest oma arstile, kes otsustab, kas teie ravi on vaja muuta.

Kui te peate minema operatsioonile või protseduurile, mis võib põhjustada veritsust, võib teie arst paluda teil ajutiselt lühikest aega selle ravimi kasutamine katkestada. Kui te ei ole kindel, kas protseduur võib veritsust põhjustada, küsige seda oma arstilt.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel vanuses alla 18 eluaasta.

Muud ravimid ja Aboxoma

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad tugevdada ja mõned vähendada Aboxoma toimet. Arst otsustab, kas teid võib ravida Aboxoma'ga, kui te võtate neid ravimeid ja kui hoolikalt teid peab jälgima.

Järgmised ravimid võivad tugevdada Aboxoma toimet ning suurendada soovimatu verejooksu tekkevõimalust:

- mõned **seennakkuste ravimid** (nt ketokonasool jt);
- mõned **viirusvastased ravimid HIV/AIDSi raviks** (nt ritonaviir);
- teised **ravimid, mida kasutatakse verehüübivuse vähendamiseks** (nt enoksapariin jt);
- **põletikuvastased ravimid** või **valuvaigistid** (nt atsetüülsalitsüülhape või naprokseen). Eriti, kui te olete vanem kui 75 aastat ning võtate atsetüülsalitsüülhapet, võib teil olla suurem verejooksuohut.
- **kõrgvererõhu või südamehaiguste ravimid** (nt diltiaseem);
- **selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid** või **serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorid** (teatud antidepressandid).

Järgmised ravimid võivad vähendada Aboxoma verehüüvete teket ennetavat toimet:

- **epilepsia- või krambivastased ravimid** (nt fenütoiin jt);
- **naistepunaürt** (depressiooni korral kasutatav taimne preparaat);
- **ravimid tuberkuloosi või teiste infektsioonide raviks** (nt rifampitsiin).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Aboxoma toime rasedusele ja veel sündimata lapsele on teadmata. Raseduse ajal ei tohi seda ravimit kasutada. Kui te rasestute selle ravimi võtmise ajal, **võtke otsekohe ühendust oma arstiga**.

Ei ole teada, kas Aboxoma eritub rinnapiima. Enne ravimi kasutamist rinnaga toitmise ajal pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Nad annavad nõu, kas lõpetada rinnaga toitmine või lõpetada/mitte alustada selle ravimi võtmist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Aboxoma ei mõjuta autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

Aboxoma sisaldab laktoosi ja naatriumi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tabletis, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Aboxoma't võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Annus

Neelake tablett koos veega. Aboxoma't võib võtta koos söögiga või ilma. Püüdke parima ravitulemuse saavutamiseks võtta tablette iga päev samal ajal.

Kui teil on raske tabletti tervena alla neelata, pidage nõu arstiga Aboxoma muude manustamisviiside osas. Tableti võib purustada ja segada vahetult enne võtmist veega või 5% glükoosi vesilahusega või õunamahla või õunapüreega.

Juhised purustamiseks:

- Purustage tabletid uhmri ja uhmrinuia abil.
- Kandke kogu pulber hoolikalt üle sobivasse nõusse ja segage siis pulber segu valmistamiseks vähese koguse, nt 30 ml (2 supilusikatäit) veega või mõne muu eespool mainitud vedelikuga.
- Neelake segu alla.
- Loputage tableti purustamiseks kasutatud uhmer ja uhmrinui ja nõu vähese veega või mõne muu vedelikuga (nt 30 ml) ja neelake loputusvesi alla.

Vajaduse korral võib teie arst manustada teile purustatud Aboxoma tableti segatuna 60 ml vee või 5% glükoosi vesilahusega nasogastraalsondi kaudu.

Võtke Aboxoma järgmiste soovitude kohaselt:

Ennetamiseks verehüüvete teket pärast puusa- või põlveliigese asendamise operatsiooni.

Soovitav annus on üks Aboxoma 2,5 mg tablett kaks korda ööpäevas, näiteks üks tablett hommikul

ja üks tablett öhtul.

Esimene tablett tuleb võtta 12...24 tundi pärast operatsiooni.

Kui teile on tehtud ulatuslik **puusa**operatsioon, võtate tavaliselt tablette 32...38 päeva.

Kui teile on tehtud ulatuslik **põlve**operatsioon, võtate tavaliselt tablette 10...14 päeva.

Ennetamaks verehüüvete teket südames südame rütmihäiretega patsientidel, kellel esineb vähemalt üks lisariskitegur.

Soovitav annus on üks Aboxoma **5 mg** tablett kaks korda ööpäevas.

Soovitav annus on üks Aboxoma **2,5 mg** tablett kaks korda ööpäevas, kui:

- teie **neerufunktsioon on väga tugevalt nõrgenenud**;
- **teie kohta kehtib vähemalt kaks alltoodud punkti**:
 - teie vereanalüüsid viitavad halvale neerufunktsioonile [seerumi kreatiniinitase on 1,5 mg/dl (133 mikromooli/l) või kõrgem];
 - te olete 80-aastane või vanem;
 - teie kehakaal on 60 kg või vähem.

Soovitav annus on üks tablett kaks korda ööpäevas, näiteks üks tablett hommikul ja üks tablett öhtul. Teie arst otsustab, kui kaua te peate ravimit võtma.

Ravimaks verehüübeid jalaveenides ja kopsuveresoontes.

Soovitav annus esimese seitsme päeva jooksul on **kaks** Aboxoma **5 mg tabletti** kaks korda ööpäevas, näiteks kaks tabletti hommikul ja kaks tabletti öhtul.

Seitsme päeva järel on soovitatav annus **üks** Aboxoma **5 mg tablett** kaks korda ööpäevas, näiteks üks tablett hommikul ja üks tablett öhtul.

Ennetamaks verehüüvete taasteket pärast kuue kuu pikkuse ravi lõpetamist.

Soovitav annus on üks Aboxoma **2,5 mg** tablett kaks korda ööpäevas, näiteks üks tablett hommikul ja üks tablett öhtul.

Teie arst otsustab, kui kaua te peate ravimit võtma.

Teie arst võib teie antikoagulantravi muuta järgnevalt:

- *Üleminek Aboxoma´lt antikoagulantidele*
Lõpetage Aboxoma võtmine. Alustage ravi antikoagulandiga (nt hepariin) ajal, mil te pidite võtma järgmise tableti.
- *Üleminek antikoagulantidelt Aboxoma´le*
Lõpetage antikoagulantide kasutamine. Alustage ravi Aboxoma´ga ajal, mil te peate saama järgmise antikoagulandi annuse, seejärel jätkake tavapäraselt.
- *Üleminek K-vitamiini antagonisti (nt varfariini) sisaldava antikoagulandiga ravilt Aboxoma kasutamisele*
Lõpetage K-vitamiini antagonisti sisaldava ravimi kasutamine. Teie arst peab tegema vereanalüüse ja andma teile juhiseid, kui te hakkate Aboxoma´t võtma.
- *Üleminek Aboxoma´ga ravilt K-vitamiini antagonisti (nt varfariini) sisaldava antikoagulandi kasutamisele*
Kui teie arst ütleb teile, et te peate hakkama kasutama K-vitamiini antagonisti sisaldavat ravimit, jätkake Aboxoma võtmist vähemalt 2 päeva pärast K-vitamiini antagonisti sisaldava ravimi esimese annuse manustamist. Teie arst peab tegema vereanalüüse ja andma teile juhiseid, kui te lõpetate Aboxoma võtmise.

Kardioversioonile suunatud patsiendid

Kui teie südame rütmihäire normaliseerimiseks on vaja teha protseduur, mida nimetatakse kardioversiooniks, võtke seda ravimit arsti poolt määratud aegadel; sellega takistate verehüüvete teket nii aju kui ka teiste kehapiirkondade veresoontes.

Kui te võtate Aboxoma´t rohkem, kui ette nähtud

Kui te olete võtnud seda ravimit rohkem kui määratud, **teavitage sellest otsekohe oma arsti**. Võtke ravimipakend endaga kaasa, isegi kui tablette ei ole enam järel.

Kui te võtate Aboxoma´t rohkem kui soovitatud, võib teil esineda suurem risk verejooksu tekkeks. Verejooksu tekkimisel võivad vajalikuks osutuda operatsioon, vereülekanded või ravi, mis aitab tühistada anti-faktor Xa aktiivsuse.

Kui te unustate Aboxoma´t võtta

- Võtke annus niipea kui meelde tuleb ning:
 - võtke järgmine Aboxoma annus tavalisel ajal;
 - seejärel jätkake nagu tavaliselt.

Kui te ei ole kindel, mida teha või kui võtmata on jäänud rohkem kui üks annus, küsige nõu oma arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt.

Kui te lõpetate Aboxoma võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma kõigepealt arstiga nõu pidamata, sest kui te lõpetate ravi väga varakult, võib verehüübe tekkerisk olla suurem.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Aboxoma võib kasutada kolme meditsiinilise seisundi korral. Teadaolevad kõrvaltoimed ja esinemissagedus nende meditsiiniliste seisundite korral võivad erineda ja on allpool eraldi välja toodud. Nende seisundite puhul on selle ravimi kõige sagedasem üldine kõrvaltoime veritsus, mis võib olla eluohtlik ning vajada otsekohest meditsiinilist sekkumist.

Aboxoma verehüüvete tekke ennetamiseks pärast puusa- või põlveliigese asendamise operatsiooni on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st)

- aneemia, mis võib põhjustada väsimust või kahvatust;
- veritsus, sealhulgas:
 - verevalum ja turse;
- iiveldus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st)

- vereliistakute arvu vähenemine (mis võib mõjutada verehüübivust);
- veritsus:
 - operatsioonijärgne verejooks, sealhulgas verevalum ja turse, vere või vedeliku immitsemine operatsioonihaavast/sisselõike kohast (haavaeritis) või süstekohal;
 - mao- või sooleverejooks või heleda/punase vere esinemine väljaheites;
 - veri uriinis;
 - ninast;
 - tupest;
- madal vererõhk, mis võib põhjustada nõrkustunnet või kiirenenud südametegevust;

- vereanalüüsides võivad ilmnedä:
 - kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajates;
 - mõnede maksaensüümide aktiivsuse suurenemine;
 - bilirubiini (vere punaliblede laguprodukt) sisalduse suurenemine, mis võib põhjustada naha ja silmavalgete kollasust;
- sügelus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st)

- allergilised reaktsioonid (ülitundlikkusreaktsioonid), mis võivad põhjustada näo, huulte, suu, keele ja/või kõri turset ning hingamisraskust. Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, **võtke otsekohe ühendust oma arstiga**;
- veritsus:
 - lihasesse;
 - silmades;
 - igemetest ja vere sisaldus väljakõhitavas rögas;
 - pärasoolest;
- juuste väljalangemine.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- veritsus:
 - pea- või seljaajus;
 - kopsudes või kõris;
 - suus;
 - kõhukoopas või selle taga asetsevas ruumis;
 - hemorroididest;
 - analüüsitulemused, mis osutavad vere sisaldumisele väljaheites või uriinis;
- nahalööve, mille korral võivad esineda villid ja väikesed märklaualaadsed lööbeelemendid (keskel olev tume laik on ümbritsetud heledama nahapiirkonnaga, mille ümber on tume rõngas) (*multiformne erüteem*).

Kui Aboxoma 7 kasutavad südames verehüüvete tekke ennetamiseks südame rütmihäiretega patsiendid, kellel esines vähemalt üks lisariskitegur, on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st)

- veritsus, sealhulgas:
 - silmadesse;
 - maos või sooles;
 - pärasoolest;
 - veri uriinis;
 - ninast;
 - igemetest;
 - verevalumid ja turse.
- aneemia, mis võib põhjustada väsimust või kahvatust;
- madal vererõhk, mis võib põhjustada nõrkustunnet või kiirenenud südametegevust;
- iiveldus;
- vereanalüüsides võib ilmnedä:
 - gammaglutamültransferaasi (GGT) aktiivsuse suurenemine.

Aeg ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st)

- veritsus:
 - pea- või seljaajus;
 - suus või veri teie süljes, kui te kõhite;
 - kõhukoopas või tupest;
 - heleda/punase vere esinemine väljaheites;
 - operatsioonijärgne verejooks, sealhulgas verevalum ja turse, vere või vedeliku immitsemine

- operatsioonihaavast/sisselõike kohast (haavaeritis) või süstekohal;
- hemorroididest;
- analüüsitulemused, mis osutavad vere sisaldumisele väljaheites või uriinis.
- vereliistakute arvu vähenemine (mis võib mõjutada verehüübivust);
- vereanalüüsides võivad ilmned:
- kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajates;
- mõnede maksaensüümide aktiivsuse suurenemine;
- bilirubiini (vere punaliblede laguprodukt) sisalduse suurenemine, mis võib põhjustada naha ja silmavalgete kollasust;.
- nahalööve;
- sügelus;
- juuste väljalangemine;
- allergilised reaktsioonid (ülitundlikkusreaktsioonid), mis võivad põhjustada näo, huulte, suu, keele ja/või kõri turset ning hingamisraskust. Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, **võtke otsekohe ühendust oma arstiga.**

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st)

- veritsus:
 - kopsudes või kõris;
 - kõhukoopa taga asetsevas ruumis;
 - lihasesse.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st)

- nahalööve, mille korral võivad esineda villid ja väikesed märklaualaadsed lööbeelemendid (keskel olev tume laik on ümbritsetud heledama nahapiirkonnaga, mille ümber on tume rõngas) (*multiformne erüteem*).

Kui võtate Aboxoma't jalaveenide ja kopsuveresoonte verehüüvete ravimiseks või nende taastekke ennetamiseks, on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st)

- veritsus, sealhulgas:
 - ninast;
 - igemetest;
 - veri uriinis;
 - verevalum ja turse;
 - maos, soolestikus, pärasoolest;
 - suus;
 - tupest.
- aneemia, mis võib põhjustada väsimust või kahvatust;
- vereliistakute arvu vähenemine (mis võib mõjutada verehüübivust);
- iiveldus;
- nahalööve;
- vereanalüüsides võivad ilmned:
- gammaglutamültransferaasi võialaniinaminotransferaasi aktiivsuse suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st)

- madal vererõhk, mis võib põhjustada nõrkustunnet või kiirenenud südametegevust
- veritsus:
 - silmadesse;
 - suus või veri süljes, kui te köhite;
 - heleda/punase vere esinemine väljaheites;
 - analüüsitulemused, mis osutavad vere sisaldumisele väljaheites või uriinis;
 - operatsioonijärgne verejooks, sealhulgas verevalum ja turse, vere või vedeliku immitsemine operatsioonihaavast/sisselõike kohast (haavaeritis) või süstekohal;

- hemorroididest;
- lihasesse.
- sügelus;
- juuste väljalangemine;
- allergilised reaktsioonid (ülitundlikkusreaktsioonid), mis võivad põhjustada näo, huulte, suu, keele ja/või kõri turset ning hingamisraskust. Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, **võtke otsekohe ühendust oma arstiga;**
- vereanalüüsides võivad ilmneda:
 - kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajates;
 - mõnede maksaensüümide aktiivsuse suurenemine;
 - bilirubiini (vere punaliblede laguprodukt) sisalduse suurenemine, mis võib põhjustada naha ja silmavalgete kollasust.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st)

- veritsus:
 - pea- või seljaajus;
 - kopsudes.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- veritsus:
 - kõhukoopas või selle taga asetsevas ruumis;
- nahalööve, mille korral võivad esineda villid ja väikesed märklaualaadsed lööbelemendid (keskel olev tume laik on ümbritsetud heledama nahapiirkonnaga, mille ümber on tume rõngas) (*multiformne erüteem*).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Aboxoma't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aboxoma sisaldab

- Toimeaine on apiksabaan. Üks tablett sisaldab 2,5 mg apiksabaani.
- Teised koostisosad (abiained) on: mikrokristalliline tselluloos (E460), laktoosmonohüdraat, naatriumkroskarmelloos (E468), naatriumlaaurüülsulfaat, hüdroksüetüütselluloos, magneesiumstearaat (E470b) tableti sisus ja hüpromelloos (E464), propüleenglükool (E1520), titaandioksiid (E171) ja talk (E553b) tableti kattes. Vt lõik 2 "Aboxoma sisaldab laktoosi ja naatriumi".

Kuidas Aboxoma välja näeb ja pakendi sisu

Valged ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus 2,5.

Tableti mõõtmed: läbimõõt ligikaudu 6 mm.

Aboxoma on saadav karbis, mis sisaldab:

- 10, 14, 20, 28, 56, 60, 100, 168 või 200 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Patsiendi ohutuskaart: kasutusjuhend

Koos pakendi infolehega on Aboxoma karbis ka patsiendi ohutuskaart või teie arst võib anda teile sarnase kaardi.

See patsiendi ohutuskaart sisaldab teavet, mis on kasulik teile ning hoiatab teisi arste, et te võtate Aboxoma[®] t. **Te peate kandma seda kaarti alati endaga kaasas.**

1. Võtke see kaart.
2. Vajadusel eraldage soovitud keeleversioon (seda lihtsustavad perforeeritud servad).
3. Täitke järgmine osa ise või paluge oma arstil seda teha
 - Nimi:
 - Sünniaeg:
 - Näidustus:
 - Annus: ... mg kaks korda ööpäevas
 - Arsti nimi:
 - Arsti telefoninumber:
4. Voltige kaart kokku ja kandke seda alati endaga kaasas.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel.: 6671658

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2021.