

PAKENDI INFOLEHT
Catophos, 100 mg/ml + 0.05 mg/ml süstelahus hobustele, veistele, koertele ja kassidele

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

CP- Pharma Handelsgesellschaft mbH
Ostlandring 13
31303 Burgdorf
Saksamaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Catophos, 100 mg/ml + 0.05 mg/ml süstelahus hobustele, veistele, koertele ja kassidele
butafosfaan, tsüanokobalamiin

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab:

Toimeained:

Butafosfaan	100,00 mg
Tsüanokobalamiin (vitamiin B ₁₂)	0,05 mg

Abiaine:

Bensüülalkohol (E1519)	20,00 mg
------------------------	----------

Selge roosa lahus.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Ainevahetus- või sigimishäirete toetav ravi, kui on vajalik fosfori ja tsüanokobalamiini täiendav manustamine.

Poegimiselsete või -järgsete ainevahetushäirete, tetaania ja pareesi (poegimishalvatus) korral tuleb ravimit manustada lisaks magneesiumile ja kaltsiumile.

Lihaskontraktsiooni toetamine fosfori ja/või tsüanokobalamiini puuduse korral.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

6. KÕRVALTOIMED

Kassidel võib pärast subkutaanset süstist abaluudevahelisse piirkonda täheldada reaktsioone süstekohas (paistetuse, turse, punetus ja tihkestumine).

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes

mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

7. LOOMALIIGID

Veis, hobune, koer ja kass.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Veised, hobused: intravenoosne manustamine.

Koerad ja kassid: intravenoosne, intramuskulaarne ja subkutaanne manustamine.

Loomaliik / alamkategoria	Butafosfaan (mg/kg)	Vitamiin B ₁₂ (µg/kg)	Ravim (ml/kg)	Manustamisviis
Veised	2,0 - 5,0	1,0 - 2,5	0,02 - 0,05	i.v.
Vasikad	3,3 - 5,6	1,65 - 2,8	0,033 - 0,056	i.v.
Hobused	2,0 - 5,0	1,0 - 2,5	0,02 - 0,05	i.v.
Varsad	3,3 - 5,6	1,65 - 2,8	0,033 - 0,056	i.v.
Koerad	2,5 - 25	1,25 - 12,5	0,025 - 0,25	i.v., i.m., s.c.
Kass	10 - 50	5,0 - 25	0,1 - 0,5	i.v., i.m., s.c.

Vajadusel korrata ravi üks kord ööpäevas.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Korki võib ohutult läbistada kuni 40 korda. Kui korki on vaja läbistada rohkem kui 40 korda, on soovitatav kasutada väljavoolunõela.

Koerte ja kasside ravimisel on soovitatav kasutada 100 ml pakendit.

10. KEELUAEG

Veis, hobune

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil pärast EXP.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Soovitatav on kindlaks teha ainevahetus- ja sigimishäirete põhjus(ed), et siis määrata kõige sobivamad

ennetus- ja ravimeetmed ning vajadus ravida täiendava fosfori ja vitamiiniga B12. Bensüülalkoholi metabolismis osalevate glükuroniseerivate metaboolsete radade puudulikkuse tõttu kassidel tuleb sellel loomaliigil seda veterinaarravimit kasutada ettevaatusega ning rangelt järgida soovitatavat annust.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Veterinaarravim sisaldab bensüülalkoholi, mis võib põhjustada ülitundlikkusreaktsioone (allergiat). Inimesed, kes on bensüülalkoholi suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Veterinaarravim võib põhjustada naha, silmade ja limaskestade ärritust, mistõttu nende kokkupuudet ravimiga tuleb vältida. Juhuslikul kokkupuutel loputada kahjustatud piirkonda põhjalikult veega.

Ravimi käsitlemise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.

Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinetel ja lakteerivatel lehmadel, märadel ning emastel koertel ja kassidel ei ole tõestatud. Samas ei tohiks ravimi kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal nimetatud loomaliikidel probleeme tekitada.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadusandlusele.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2023

15. LISAINFO

II tüüpi merevaikkollane klaasviaal bromobutüülist punnkorgi ja eemaldava kattega alumiiniumkorgiga.

Pakendi suurused:

Pappkarp ühe 100 ml viaaliga.

Pappkarp ühe 250 ml viaaliga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Tel: 800 9000

E-post: zoovet@zoovet.ee