

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Viaali silt

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oxyto-kel, 10 RÜ/ml süstelahus
Oksütotsiin

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

Oksütotsiini 10 RÜ

Abiaine: Fenool

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

30 ml

50 ml

100 ml

5. LOOMALIIGID

Hobune, veis, lammas, kits, siga, koer.

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne, intramuskulaarne või subkutaanne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Hobune, veis, siga, lammas, kits: 0 päeva

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Preparaati ei tohi kasutada ega sellega juhuslikult kokku puutuda rasedad naised, sünnitanud naised ja imetavad naised. Rasedatel naistel võivad juhusliku enesesüstimise tagajärjel tekkida emaka kontraktsioonid.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Pärast pakendi avamist kasutada kuni ...

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaaravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KELA N.V., Sint Lenaartseweg 48, B-2320 Hoogstraten, Belgia

16.MÜÜGILOA NUMBER

Müügiloa nr: 1065

17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER

Partii nr