

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**Karp**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ACC 100 mg kihisevad tabletid

ACC 200 mg kihisevad tabletid

*acetylcysteinum*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kihisev tablett sisaldab 100 mg atsetüültsüsteini.

Üks kihisev tablett sisaldab 200 mg atsetüültsüsteini.

### 3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi, sorbitooli ja naatriumi. Lisateavet vt pakendi infoleht.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kihisev tablett

20 kihisevat tabletti

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

### 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Hoida tuub tihedalt suletuna.

### 10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

### 11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:  
Sandoz d.d.  
Verovškova 57  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia

## 12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

100 mg:  
Müügiloa nr: 252799

200 mg:  
Müügiloa nr: 252899

## 13. PARTII NUMBER

Lot

## 14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

## 15. KASUTUSJUHEND

Röga lahtistamine.

Lahustage tabletid klaasitäies vees.

100 mg Annustamine: täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid 4...6 tabletti ööpäevas. Lapsed vastavalt vanusele – lugege pakendi infolehte.

200 mg Annustamine: täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid 2...3 tabletti ööpäevas. Lapsed vastavalt vanusele – lugege pakendi infolehte.

## 16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

acc 100 mg tabletid

acc 200 mg tabletid

## 17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Ei kohaldata.

## 18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL**

**Tuub**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

ACC 100 mg kihisevad tabletid

ACC 200 mg kihisevad tabletid

*acetylcysteinum*

Suukaudne

**2. MANUSTAMISVIIS**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUMBER**

Lot

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

20 kihisevat tabletti

**6. MUU**