

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**Karp**

### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Advantix täpilahus koertele kuni 4 kg  
Advantix täpilahus koertele üle 4 kg kuni 10 kg  
Advantix täpilahus koertele üle 10 kg kuni 25 kg  
Advantix täpilahus koertele üle 25 kg kuni 40 kg  
Advantix täpilahus koertele üle 40 kg kuni 60 kg  
*Imidaclopridum/Permethrinum*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 0,4 ml pipett sisaldab:  
40 mg imidaklopriidi ja 200 mg perimetriini.  
Üks 1,0 ml pipett sisaldab:  
100 mg imidaklopriidi ja 500 mg perimetriini.  
Üks 2,5 ml pipett sisaldab:  
250 mg imidaklopriidi ja 1250 mg perimetriini.  
Üks 4,0 ml pipett sisaldab:  
400 mg imidaklopriidi ja 2000 mg perimetriini.  
Üks 6,0 ml pipett sisaldab:  
600 mg imidaklopriidi ja 3000 mg perimetriini.

### 3. RAVIMVORM

Täpilahus.

### 4. PAKENDI SUURUS(ED)

1 pipett	(1x 0,4 ml, 1x 1,0ml, 1x 2,5 ml, 1x 4,0ml, 1x 6,0ml)
2 pipetti	(2x 0,4 ml, 2x 1,0ml, 2x 2,5 ml, 2x 4,0ml, 2x 6,0ml)
3 pipetti	(3x 0,4 ml, 3x 1,0ml, 3x 2,5 ml, 3x 4,0ml, 3x 6,0ml)
4 pipetti	(4x 0,4 ml, 4x 1,0ml, 4x 2,5 ml, 4x 4,0ml, 4x 6,0ml)
6 pipetti	(6x 0,4 ml, 6x 1,0ml, 6x 2,5 ml, 6x 4,0ml, 6x 6,0ml)

### 5. LOOMALIIGID

Koer.

### 6. NÄIDUSTUS(ED)

[Karbile: tekst esiküljele (ainult karbil)]

- Kirbunakkuse raviks ning profülaktikaks; koeraväivi ja puuginakkuse raviks.
- Peletab puugid, pistesääsed, moskiitod ja pistekärbsed.
- Vähendab koerte leišmanioosi ja koerte erlihhiioosi edasikandumise ohtu.

[Karbile: tekst tagaküljele (ainult karbil)]

- Kirbunakkuse raviks ning profülaktikaks; võib kasutada kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD) ravistrateegia osana.
- Hävitab koeraväivid.

- Koeraväivi ja puuginakkuse raviks. Peletava ja surmava toime tõttu vähendab koerte vektorite poolt siirutatud haiguste (nt borrelioos, riketsioos ja erlihhiios) edasikandumise ohtu.
- Peletab pistesääsed ja moskiitod, vähendades leišmanioosi edasikandumise ohtu.
- Peletab pistekärbsed, aidates ära hoida kärbseshammustustest põhjustatud dermatiiti.

## 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida fooliumpakend blistritega välispakendis.




0,4 ml



1,0 ml



2,5 ml



4,0 ml

## 8. KEELUAEG

## 9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 1,5 kg kaaluvatel kutsikatel.

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 4 kg kaaluvatel kutsikatel.

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 10 kg kaaluvatel kutsikatel.

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 25 kg kaaluvatel kutsikatel.

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 40 kg kaaluvatel kutsikatel.

Mitte manustada kassidele.



## 10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kasutada 24 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist või enne EXP lõppu, kui see on lühem. (0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml)

Kasutada 12 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist või enne EXP lõppu, kui see on lühem. (6,0 ml)

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte lasta külmuda.

Pärast fooliumpakendi avamist hoida kuivas kohas temperatuuril kuni 30 °C.

## 12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE "AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS" NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.  
Käsimüügiravim.

**14. MÄRGE "HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS"**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Müügiloa hoidja:  
Bayer Animal Health GmbH  
51368 Leverkusen  
Saksamaa

Tootja:  
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324, 24106, Kiel  
Saksamaa

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

EE 1173  
EE 2331  
EE 2332  
EE 2333  
EE 2084

**17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER**

Lot



[Pipeti kujutis, koera foto, Bayer logo ja rist]

Lisainfo:

- Toime säilib, kui koer saab märjaks.
- Omab larvitsiidset toimet ravitud koerte vahetus ümbruses olevatesse kirpudesse.
- Lubatud kasutada nii tiinetel kui imetavatel koertel.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**Pipeti etikett**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Advantix

**2. TOIMEAINE(TE) KOGUS**

100 mg/ml *imidaclopridum*, 500 mg/ml *permethrinum*

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

0,4 ml  
1,0 ml  
2,5 ml  
4,0 ml  
6,0 ml

**4. MANUSTAMISVIIS(ID)**

**5. KEELUAEG**

**6. PARTII NUMBER**

Lot:

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP:


**8. MÄRGE“AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**




≤4 kg




>4 kg ≤ 10 kg



>10 kg ≤ 25 kg



>25 kg ≤ 40 kg



>40 kg ≤ 60 kg



**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL**

**Blisterpakend**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Advantix

**2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI**




**3. KÕLBLIKKUSAEG**

**4. PARTII NUBER**

**5. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**




**0.4 ml**  
**≤4 kg**




**1.0 ml**  
**>4 kg ≤ 10 kg**



**2.5 ml**  
**>10 kg ≤ 25 kg**



**4.0 ml**  
**>25 kg ≤ 40 kg**



**6.0 ml**  
**>40 kg ≤ 60 kg**



**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL**

**Fooliumkotike**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Advantix

**2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI**



**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUBER**

Lot

**5. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**




$\leq 4$  kg  
0,4 ml




$>4$  kg  $\leq 10$  kg  
1,0 ml



$>10$  kg  $\leq 25$  kg  
2,5 ml



$>25$  kg  $\leq 40$  kg  
4,0 ml



$>40$  kg  $\leq 60$  kg  
6,0 ml



**6. MUU**



0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml

Kasutada 24 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist või enne EXP lõppu, kui see on lühem.

6,0 ml

Kasutada 12 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist või enne EXP lõppu, kui see on lühem.