

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Drycloxa-kel 685,13 mg/9 g intramammaarsalv kinnislehmadele.
Kloksatsilliin

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

1 annus (9 g) intramammaarsalvi sisaldab 1000 mg kloksatsilliinbensatiini, mis vastab 685,13 mg kloksatsilliinile.

Abiaine(d):

Butüülhüdrosütolueen (E 321), alumiiniummonostearaat, vedel parafiin.

3. RAVIMVORM

Intramammarsalv

4. PAKENDI SUURUS

20 süstalt

5. LOOMALIIGID

Veis (kinnislehmad).

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramammaarne

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 10 päeva pärast ravimi manustamist.

Piimale: 12 tundi pärast poegimist, kui ravim manustati rohkem, kui 60 päeva enne poegimist.
60 päeva ja 12 tundi pärast ravimi manustamist, kui ravim manustati vähem, kui 60 päeva enne poegimist.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KELA N.V.
St. Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
Belgia

16. MÜÜGILOA NUMBER

1194

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Süstal (9 g)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Drycloxa-kel 685,13 mg/9 g intramammaarsalv kinnislehmadele.
Kloksatsilliin

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

1 annus (9 g) intramammaarsalvi sisaldab 1000 mg kloksatsilliinbensatiini, mis vastab 685,13 mg kloksatsilliinile.

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 annus (9 g)

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Intramammaarne

5. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavad kudedele: 10 päeva pärast ravimi manustamist.

Piimale: 12 tundi pärast poegimist, kui ravim manustati rohkem, kui 60 päeva enne poegimist.
60 päeva ja 12 tundi pärast ravimi manustamist, kui ravim manustati vähem, kui 60 päeva enne poegimist.

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.