

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**KARP**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Docetaxel Ebewe 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

*Docetaxelum*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 2 ml vial sisaldab 20 mg dotsetakseeli (10 mg/ml).

Üks 8 ml vial sisaldab 80 mg dotsetakseeli (10 mg/ml).

Üks 16 ml vial sisaldab 160 mg dotsetakseeli (10 mg/ml).

### 3. ABIAINED

Abiained: polüsorbaat 80, veevaba sidrunhape, makrogool 300, 96% etanool.

Lisateavet lugege pakendi infolehest.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat

1 vial

5 viaali

10 viaali

20 mg/2 ml

80 mg/8 ml

160 mg/16 ml

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist lahjendada.

Viaali on võimalik mitmekordselt kasutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütostaatikum.

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 28 päeva.

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25°C.  
Mitte lasta külmuda.  
Lahjendatud ravimpreparaadi säilitustingimusi vt pakendi infolehest.  
Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST  
TEKKINUD JÄÄTME-MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE****11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Sandoz d.d.  
Verovškova 57,  
SI-1000 Ljubljana,  
Sloveenia

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 668110

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND****16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Põhjendus Braille' mittelisamiseks

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood**

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:  
SN:  
NN:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**VIAALI ETIKETT**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

Docetaxel Ebewe 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat  
*Docetaxelum*

Intravenoosne.

**2. MANUSTAMISVIIS**

Enne kasutamist lahjendada.

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 28 päeva.

**4. PARTII NUMBER**

Lot

**5. PAKENDI SISU, KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

20 mg/2 ml

80 mg/8 ml

160 mg/16 ml

**6. MUU**

Tsütostaatikum

SANDOZ