

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED****KARP (1 VIAAL)****1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Bleomycin medac 15000 RÜ 30000 RÜ süstelahuse pulber  
*Bleomycini sulfas*

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

Üks 10 ml viaal sisaldab 15000 RÜ (Ph.Eur.) bleomütsiinsulfaati.  
Üks 20 ml viaal sisaldab 30000 RÜ (Ph.Eur.) bleomütsiinsulfaati.  
1 mg kuiva pulbrit vastab vähemalt 1500 RÜ (Ph.Eur.).

**3. ABIAINED****4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS**

<Süstelahuse pulber>

1 viaal, 10 ml

1 viaal, 20 ml

**5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)**

Ainult ühekordseks kasutamiseks.  
i.v., i.m., s.c., intraarteriaalne, intraperitoneaalne, intrapleuraalne, intratumoraalne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)****8. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:



**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida külmkapis.  
Kasutada kohe pärast lahustamist.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST  
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Tsütostaatikum. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

medac GmbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Saksamaa

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 730011

**13. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND****16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

<Põhjendus Braille' mitte lisamiseks>

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood**


<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:  
SN:  
NN:

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

**KARP (10 VIAALI)**



## 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bleomycin medac 15000 RÜ 30000 RÜ süstelahuse pulber  
*Bleomycini sulfas*

## 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 10 ml viaal sisaldab 15000 RÜ (Ph.Eur.) bleomütsiinsulfaati.  
Üks 20 ml viaal sisaldab 30000 RÜ (Ph.Eur.) bleomütsiinsulfaati.  
1 mg kuiva pulbrit vastab vähemalt 1500 RÜ (Ph.Eur.).

## 3. ABIAINED

## 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

<Süstelahuse pulber>

10 viaali, 10 ml

10 viaali, 20 ml

## 5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Intravenoosne.  
Intramuskulaarne.  
Subkutaanne.  
Intraarteriaalne.  
Intraperitoneaalne.  
Intrapleuraalne.  
Intratumoraalne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

## 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

## 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütostaatikum.

## 8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

## 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.  
Kasutada kohe pärast lahustamist.



**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST  
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Sisaldab tsütostaatikumi (vt hoiatust pakendi infolehes). Kasutamata ravimikogus tuleb hävitada.  
Kasutamata ravim ja jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõudmistele.

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

medac GmbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Saksamaa

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 730011

**13. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

<Põhjendus Braille' mitte lisamiseks>

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод**

<Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:  
SN:  
NN:



**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**VIAAL**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

Bleomycin medac 15000 RÜ 30000 RÜ süstelahuse pulber  
*Bleomycini sulfas*

**2. MANUSTAMISVIIS**

i.v., i.m., s.c., intraarteriaalne, intraperitoneaalne, intrapleuraalne, intratumoraalne.

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP:

**4. PARTII NUMBER**

Lot:

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

Üks 10 ml viaal = 15000 RÜ (Ph.Eur.) bleomütsiinsulfaati.

Üks 20 ml viaal = 30000 RÜ (Ph.Eur.) bleomütsiinsulfaati.

**6. MUU**

Tsütostaatikum. Ainult ühekordseks kasutamiseks.  
Hoida külmkapis. Kasutada koheselt pärast lahustamist.

