

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED****KARP****1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Flebaven 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

mikroniseeritud diosmiin

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg mikroniseeritud diosmiini.

**3. ABIAINED****4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS**

Õhukese polümeerikattega tablett

15 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

120 õhukese polümeerikattega tabletti

150 õhukese polümeerikattega tabletti

180 õhukese polümeerikattega tabletti

**5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

**6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)****8. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

**12. MÜÜGILOA NUMBER**

Müügiloa nr: 948417

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Käsimüügiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

**Valu jalgades**  
**Raskustunne jalgades**  
**Hemorroidid**

Kroonilise venoosse puudulikkusega seotud jalasümptomite (jalavalu, raskustunne, öised lihaskrampid, jala turse) ning hemorroididega seotud vaevuste (valu, veritsus ja paistetus anaalpiirkonnas) ägenemise sümptomaatiline ravi täiskasvanutel.

**Annustamine:**

Krooniline venoosne puudulikkus: 2 tabletti ööpäevas, sisse võetuna ühe annusena või kahe eraldi annusena.

Hemorroididega seotud vaevuste ägenemine: 6 tabletti ööpäevas esimesel neljal päeval (3 tabletti kaks korda ööpäevas); seejärel 4 tabletti ööpäevas (2 tabletti kaks korda ööpäevas) kolmel järgmisel päeval. Seejärel säilitusravina 2 tabletti ööpäevas (1 tablett kaks korda ööpäevas). Ravi võib kesta kuni 15 päeva.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Flebaven 500 mg

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood**

Ei kohaldata.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL  
BLISTER**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Flebaven 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
mikroniseeritud diosmiin

**2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI**

KRKA

**3. KÕLBLIKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUMBER**

Lot

**5. MUU**